# Инструкция по применению
# Прополиса Настойка-Реневал 25 мл

## Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Обновление ПФК АО
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Прополис
Количество в упаковке: 1




## Описание

Прозрачная жидкость от желтовато-коричневого до красновато-коричневого цвета, с характерным запахом. Допускается зеленоватый оттенок.

## Действующее вещество

Прополис

## Состав

Для получения настойки используют:Активный компонент:Прополис - 100 гВспомогательное вещество:Этанол (спирт этиловый) 80% - до получения 1000 мл настойки

## Форма выпуска

Раствор

## Показания

Микротравмы, поверхностные повреждения кожных покровов и слизистых оболочек, отит, фарингит, тонзиллит, заболевания пародонта.

**Способ применения и дозы**

Наружно, местно, ингаляционно.Участки с поверхностными повреждениями кожных покровов (микротравмами) обрабатывают тампоном, смоченным настойкой прополиса, 1-3 раза в день.При хронических гнойных отитах после тщательной очистки от гноя в ухо вводят тампон, пропитанный настойкой прополиса, на 1-2 минуты 2-3 раза в день или по 1-2 капли в ухо 3-4 раза в день.При хроническом фарингите и тонзиллите настойкой прополиса смазывают миндалины 1-2 раза в день в течение 8-15 дней.Для ингаляций используют водный раствор настойки прополиса, приготовленный в соотношении 1:20 (1 часть настойки прополиса разведенной в 20 частях воды). Курс лечения 1-2 ингаляции в день в течение 7-10 дней.При заболеваниях пародонта настойку прополиса вводят на турундах в пародонтальные карманы на 5 минут после глубокого кюретажа.При повреждениях слизистой оболочки полости рта водный раствор настойки прополиса (15 мл, разведенных в 1/2 стакана теплой воды) применяют для полосканий 4-5 раз в день в течение 3-4 дней. Применяйте препарат согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата и продуктам пчеловодства, поллинозы, острая экзема, детский возраст до 18 лет.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

**Побочные действия**

Возможны аллергические реакции (зуд, покраснение кожи, сыпь), кратковременное ощущение жжения в месте нанесения.Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, обратитесь к лечащему врачу.

**Передозировка**

О случаях передозировки не сообщалось.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Не изучалось.

**Особые указания**

При развитии аллергических реакций применение препарата следует прекратить. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора и другое).

**Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.