Инструкция по применению
Прополиса Тверская ФФ Настойка 25 мл

Характеристики

Форма выпуска: Настойка
Страна: Россия
Производитель: Тверская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Прополис
Количество в упаковке: 1



Описание

Прозрачная жидкость от желто-коричневого до красно-коричневого цвета с характерным запахом прополиса. В процессе хранения допускается образование налета на стенках первичной упаковки.

Действующее вещество

Прополис

Состав

Для приготовления 1 000 мл настойки используют: Прополис - 100 г Вспомогательное вещество Этанол (спирт этиловый) 80 % - до получения 1000 мл настойки.

Форма выпуска

Настойка

Показания

Микротравмы и поверхностные повреждения кожных покровов и слизистых оболочек, отит, фарингит, тонзиллит, заболевания пародонта.

Способ применения и дозы

Наружно, местно, ингаляционно. Участки с поверхностными повреждениями кожных покровов (микротравмами) обрабатывают тампоном, смоченным препаратом, 1-3 раза в день. При хронических отитах (в том числе гнойных отитах после тщательной очистки от гноя) в ухо вводят тампон, пропитанный препаратом, на 1-2 минуты 2-3 раза в день или закапывают по 1-2 капли в ухо 3-4 раза в день. При хроническом фарингите и тонзиллите препаратом смазывают миндалины 1-2 раза в день в течение 8-15 дней. Кроме того, при хроническом тонзиллите водный раствор препарата в соотношении 1:20 используют для ингаляций. Курс лечения 1 -2 ингаляции в день в течение 7-10 дней. При заболеваниях пародонта препарат вводят на турундах в пародонтальные карманы на 5 минут после глубокого кюретажа. При повреждениях слизистой оболочки полости рта водный раствор препарата (15 мл на 1 /2 стакана теплой воды) применяют для полосканий 4-5 раз в день в течение 3-4 дней. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата и продуктам пчеловодства, поллинозы, острая экзема, детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции (зуд, покраснение кожи, сыпь), кратковременное ощущение жжения в месте нанесения. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени сведения о передозировке препарата не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Не описано.

Особые указания

При развитии аллергических реакций применение препарата следует прекратить. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 12 до 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.