Инструкция по применению
Прополиса Настойка 25 мл

Характеристики

Форма выпуска: Настойка
Страна: Россия
Производитель: Гиппократ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Прополис
Количество в упаковке: 1



Описание

Прозрачная жидкость от желто-коричневого до красно-коричневого цвета с характерным запахом.

Действующее вещество

Прополис

Состав

Активный компонент:Прополис -100гВспомогательное вещество:Этанол (спирт этиловый) 80 % - до получения 1000 мл настойки.

Форма выпуска

Настойка

Показания

Микротравмы и поверхностные повреждения кожных покровов и слизистых оболочек, отит, фарингит, тонзиллит, заболевания пародонта.

Способ применения и дозы

Наружно, местно, ингаляционно. Участки с поверхностным повреждением кожных покровов (микротравмы) обрабатывают тампоном, смоченным настойкой прополиса, 1-3 раза вдень, пропитанный настойкой прополиса, на 1-2 минуты 2-3 раза в день или по 1-2 капли в ухо 3-4 раза в день.При хроническом фарингите и тонзиллите настойкой прополиса смазывают миндалины 1 -2 раза в день в течение 8-15 дней. Кроме того, при хроническом тонзиллите водный раствор настойки прополиса в соотношении 1:20 используют для ингаляций. Курск лечения 1 -2 ингаляции в день в течение 7-10 дней. При заболеваниях пародонта настойку прополиса вводят на турундах в пародонтальные карманы на 5 минут после глубокого кюретажа.При повреждениях слизистой оболочки полости рта водный раствор настойки прополиса (15 мл на ½ стакана теплой воды) применяют для полосканий 4-5 раза в день в течение 3-4 дней. Если в период лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому и способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к продуктам пчеловодства, поллинозы, острая экзема, детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции (зуд, покраснение кожи, сыпь), кратковременное жжение в месте нанесения.Если у вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

О случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Если вы применяете другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата проконсультироваться с врачом.

Особые указания

При развитии аллергических реакций применение препарата следует прекратить. Применение препарата не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами и выполнение других потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.Беречь от замораживания.Хранить в недоступном для детей месте.