Инструкция по применению
Прополиса МФФ Настойка 25 мл

Характеристики

Форма выпуска: Настойка
Страна: Россия
Производитель: МОСКОВСКАЯ ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Прополис
Количество в упаковке: 1



Описание

Прозрачная жидкость от желто-коричневого до красно-коричневого цвета с характерным запахом прополиса. При охлаждении жидкости наблюдается естественное помутнение, которое обратимо при повышении температуры.

Действующее вещество

Прополис

Состав

Для приготовления настойки используют: Прополис - 100 г Этанол (спирт этиловый) 80 % - достаточное количество для получения 1000 мл настойки.

Форма выпуска

Настойка

Показания

Микротравмы, поверхностные повреждения кожных покровов и слизистых оболочек, хронический отит, фарингит, тонзиллит, заболевания пародонта.

Способ применения и дозы

Наружно, местно, ингаляционно. Участки с поверхностными повреждениями кожных покровов (микротравмами) обрабатывают тампоном, смоченным настойкой прополиса, 1 - 3 раза в день. При хронических отитах (в том числе гнойных отитах после тщательной очистки от гноя) в ухо вводят тампон, пропитанный настойкой прополиса, на 1 - 2 минуты 2-3 раза в день или по 1 - 2 капли в ухо 3-4 раза в день. При хроническом фарингите и тонзиллите настойкой прополиса смазывают миндалины I - 2 раза в день в течение 8-15 дней. Кроме того, при хроническом тонзиллите водно-спиртовой раствор настойки прополиса в соотношении 1:20 используют для ингаляций. Курс лечения 1 - 2 ингаляции в день в течение 7-10 дней. При заболеваниях пародонта настойку прополиса вводят в турундах в пародонтальные карманы на 5 минут после глубокого кюретажа. При повреждениях слизистой оболочки полости рта водно-спиртовой раствор настойки прополиса (15 мл (1 столовая ложка настойки) на 100 мл (1/2 стакана) теплой кипяченой воды) применяют для полосканий 4-5 раз в день в течение 3-4 дней. Если после лечения улучшения не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата и продуктам пчеловодства, поллинозы, острая экзема, детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции (зуд, покраснение кожи, сыпь), кратковременное ощущение жжения в месте нанесения препарата. При развитии аллергических реакций применение препарата следует прекратить. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки при применении препарата не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

Не описано.

Особые указания

При развитии аллергических реакций применение препарата следует прекратить. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.