Инструкция по применению
Пропосол Спрей 25 г

Характеристики

Форма выпуска: Спрей
Страна: Россия
Производитель: Алтайвитамины
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Прополис
Количество в упаковке: 1



Описание

Жидкость от зеленовато-желтого до коричневого цвета, с характерным запахом прополиса.

Действующее вещество

Прополис

Состав

Состав (на 1 баллон): 25 г 50 г Действующее вещество: прополис 1,5 г или 3,0 г Вспомогательные вещества: этанол (спирт этиловый) 95% 20,0 г или 40,0 г глицерол (глицерин) 3,5 г или 7,0 г

Форма выпуска

Спрей

Показания

Воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта: катаральный гингивит и стоматит, афтозный и язвенный стоматит, пародонтит.

Способ применения и дозы

Местно. Перед применением снимают с баллона предохранительный колпачок и на шток клапана надевают распылительную насадку, нажимают несколько раз для того, чтобы раствор поступил в насадку. После выхода раствора из насадки наконечник направляют в полость рта и нажимают на нее 3-4 раза, равномерно орошают воспаленную область. Длительность распыления - до 2 секунд. В остром периоде воспалительного процесса орошение производят 2-3 раза в день, при уменьшении воспалительного процесса - 1-2 раза в день до полного выздоровления (обычно в течение 3-7 дней). После орошения ротовой полости желательно не употреблять пищу в течение 15-30 мин. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата и продуктам пчеловодства, экзема, детский возраст до 18 лет (в связи с отсутствием клинических данных).

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания не рекомендуется (в связи с отсутствием клинических данных).

Побочные действия

Кратковременное жжение в месте нанесения препарата, аллергические реакции, покраснение кожных покровов, зуд кожи, ангионевротический отек. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При возможной передозировке препарата возможно усиление дозозависимых побочных эффектов. В этом случае применение препарата следует прекратить. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Не описано. Если Вы применяете лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Пропосол проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата составляет 0,28 г, в максимальной суточной дозе - 0,84 г. Перед применением препарата рекомендуется прополоскать ротовую полость теплой кипяченой водой. Упаковку следует предохранять от ударов, падений, прямых солнечных лучей. Недопустимо попадание препарата в глаза.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат содержит этиловый спирт, поэтому в период применения препарата следует воздержаться от выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Условия хранения

Хранить при температуре не ниже 0 °С и не выше 35 °С. Хранить в недоступном для детей месте, вдали от источников огня.