Инструкция по применению
Пирроксан таблетки 15 мг 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармзащита НПЦ
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Пироксан
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 15 мг
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Пироксан

Состав

Пироксана гидрохлорид - 15 мг; ;Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат-78,0 мг, крахмал картофельный-5,0 мг, тальк - 1,0 мг, кальция стеарат - 1,0 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Установлено, что препарат хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте, но эффективная концентрация достигается лишь через 30 - 40 минут и сохраняется 3-4 часа. Связывание с белками плазмы слабое. У препарата отмечен большой объем распределения, он быстро проникает в различные ткани и жидкости, включая ликвор. Хорошо проникает через гистогематические барьеры, в том числе гематоэнцефалический. Избирательно задерживается в гипоталамусе, задняя область которого содержит преимущественно норадренергические нейроны. Выводится, в основном, почками. Около 70 % от введенной дозы выводится почками в первые 24 часа.; ;В опытах на животных при внутрибрюшинном введении время полувыведения установлено не было, при этом в плазме крови через 1 час после введения сохранялось менее 5 % от введенной дозы препарата, а через 2 часа - только следы. В головном мозге через 1 час обнаруживали 22 %, через 2 часа - 6 % от максимальной концентрации. Также в опытах с меченым углеродом пироксаном было показано, что продукты его метаболизма способны надолго (до 10 суток) задерживаться в различных органах и тканях (плазма, головной мозг, печень, почки).

Показания

- соматоформная вегетативная дисфункция, протекающая по симпатоадреналовому типу, в т.ч. с повышением артериального давления (в качестве симптоматического средства в составе комплексной терапии); - аллергические дерматиты (в качестве симптоматического средства в составе комплексной терапии для купирования зуда).

Способ применения и дозы

При соматоформной вегетативной дисфункции, протекающей по симпато-адреналовому типу в составе комплексной терапии назначают по 15-30 мг (1- 2 таблетки) внутрь 2-3 раза в день. Длительность лечения определяется лечащим врачом.;При аллергических дерматитах в составе комплексной терапии рекомендуется назначать по 15-30 мг (1-2 таблетки) внутрь перед сном. Длительность лечения определяется лечащим врачом.

Противопоказания

- гиперчувствительность к активному веществу или вспомогательным компонентам препарата; - выраженный атеросклероз; - выраженная цереброваскулярная недостаточность (в т.ч. инсульты, транзиторные ишемические атаки в анамнезе); - ишемическая болезнь сердца (II-IV функциональный класс),;- недостаточность кровообращения II-III степени; - артериальная гипотензия; - кардиогенный шок; - брадикардия; - инфаркт миокарда; - непереносимость галактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, недостаточность лактазы; - детский возраст до 18 лет.; С осторожностью: С осторожностью следует применять у пациентов пожилого возраста, ишемическая болезнь сердца, аритмии, язвенная болезнь желудка. Рекомендуется контролировать концентрацию глюкозы в крови (возможно повышение уровня эндогенного инсулина).;Беременность и лактаци

Побочные действия

Со стороны сердечно-сосудистой системы: брадикардия, артериальная гипотония, возникновение приступов стенокардии у предрасположенных пациентов, ортостатическая гипотензия, аритмии, головокружение, гиперемия кожных покровов, заложенность носа.;Со стороны желудочно-кишечного тракта: диарея, повышение секреции соляной кислоты в желудке.;Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: брадикардия, ортостатический коллапс, резкое снижение артериального давления.;Лечение: симптоматическое, направленное на поддержание жизненно важных функций.

Взаимодействие с другими препаратами

- усиливает действие нейролептиков (производные фенотиазина, бутирофенона, дифенилбутилпиперидина, тиоксантена); - на фоне применения новокаинамида возможно снижение ударного объема сердца; - при одновременном применении с адреналином возможно извращение его действия - развитие депрессорного эффекта вместо прессорного; - одновременное применение пароксана с гипотензивными средствами приводит к взаимному потенцированию их эффектов по снижению артериального давления.; ;В том случае, если вы принимаете другие лекарства, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Особенности действия лекарственного препарата при первом приеме;При приеме первой дозы препарата возможно резкое понижение артериального давления, обморок, головная боль, слабость, сердцебиение и ухудшение субъективного состояния ("феномен первой дозы"), что не является поводом для отмены препарата, поскольку этот эффект исчезает при повторном приеме. Также отмечают сонливость, быстро проходящее ощущение онемения языка. Кроме того, рекомендуется контролировать концентрацию глюкозы в крови из-за возможного повышения уровня эндогенного инсулина. В связи с чем, необходимо начинать лечение под наблюдением врача с минимальной эффективной дозы и соблюдать постельный режим после приема препарата в течение 6-8 часов.

Условия хранения

В сухом месте