Инструкция по применению
Проспан Капли флакон 20 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Германия
Производитель: Энгельхард Арцнайметтель
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Плюща листьев экстракт
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 2 г/100 мл
Срок годности: 48

Описание

Отхаркивающее средство растительного происхождения

Действующее вещество

Плюща листьев экстракт

Состав

Экстракт листьев плюща сухой, эстрагент этанол 30% (5 - 7.5:1) 2 г.

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Поскольку препарат представляет собой сухой экстракт листьев плюща и содержит комплекс биологически активных веществ, проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

Показания

В качестве отхаркивающего средства в терапии острых и хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.

Способ применения и дозы

Внутрь. Детям в возрасте 1-3 лет по 10 капель 3-5 раз в день, детям 4-7 лет по 15 капель 3-5 раз в день, детям старше 7 лет и взрослым по 20 капель 3-5 раз в день. Капли необходимо принимать перед приемом пищи. Маленьким детям рекомендуется давать капли с небольшим количеством воды. Курс лечения определяется тяжестью заболевания, минимальный курс лечения должен составлять 1 неделю.Для закрепления терапевтического эффекта рекомендуется после исчезновения симптомов болезни продолжить лечение еще в течение 2-3 дней. При отсутствии улучшения состояния необходимо обратиться к врачу. Перед употреблением взбалтывать!Ингаляционная терапия с применением препарата Проспан®, капли для приема внутрь и ингаляций.Для проведения ингаляций с использованием препарата Проспан®, капли для приема внутрь и ингаляций, пригодны все стандартные устройства и приборы для распыления без нагрева (небулайзеры). Для предотвращения побочных эффектов раздражения вследствие содержания этилового спирта, при проведении ингаляций препарат необходимо разбавить питьевой водой в соотношении 1:2.В специальный ингаляционный прибор накапать 20-25 капель препарата и развести питьевой водой комнатной температуры в соотношении 1:2. Ингаляции проводить 3-5 раз в день.

Противопоказания

При приеме внутрь: повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст (до 1 года), алкоголизм и другие состояния, при которых противопоказан прием этилового спирта.При ингаляционном способе применения: повышенная чувствительность к компонентам препарата, бронхиальная астма, предрасположенность к ларингоспазму, детский возраст до 2 лет (возможность возникновения ларингоспазма).С осторожностью. Заболевания печени, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

Применение при беременности и кормлении грудью

В связи с недостаточностью данных по безопасности применения препарата беременными и кормящими женщинами, указанной группе пациентов принимать препарат не рекомендуется.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Прием дозы, значительно превышающей предписанную дневную дозу (больше, чем в 3 раза) может вызвать тошноту, рвоту и диарею. В этом случае пациент должен обратиться к врачу. Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания

Препарат содержит 47 об. % спирта.В максимальной разовой дозе для взрослых (20 капель) содержится 0.25 г абсолютного этилового спирта, в максимальной суточной дозе для взрослых содержится 1.27 г абсолютного этилового спирта. В одной капле препарата содержится 0.013 г абсолютного этилового спирта. Не содержит сахара, консервантов и красителей.В процессе хранения возможно легкое помутнение жидкости, образование осадка и незначительные изменения вкуса, что не влияет на терапевтическое действие препарата.При применении препарата следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В сухом месте