Инструкция по применению
Проспан Раствор для приема внутрь 100 мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Германия
Производитель: Энгельхард Арцнайметтель
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Плюща листьев экстракт
Количество в упаковке: 1

Описание

Прозрачная жидкость светло-коричневого цвета с запахом вишни. Допускается наличие легкой опалесценции.

Действующее вещество

Плюща листьев экстракт

Состав

В 100 мл препарата содержится: активный компонент: плюща обыкновенного листьев экстракт сухой, экстрагент - этанол 30 % (5 - 7,5 : 1) - 700,0 мг; вспомогательные вещества: вода очищенная - 56666,00 мг; калия сорбат - 134,0 мг; лимонная кислота безводная - 50,0 мг; сорбитол жидкий кристаллизующийся - 55000,00 мг; камедь ксантановая - 150,00 мг; ароматизатор вишневый - 300,00 мг.

Форма выпуска

Раствор

Фармакокинетика

Поскольку препарат представляет собой сухой экстракт листьев плюща и содержит комплекс биологически активных веществ, проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

Показания

В качестве отхаркивающего средства в терапии острых и хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.

Способ применения и дозы

Внутрь. Грудным детям (0-1 год) - по 2,5 мл два раза в день. Маленьким детям (1-6 лет) по 2,5 мл 3 раза в день. Детям школьного возраста и подросткам по 5 мл 3 раза в день. Взрослым по 5 - 7,5 мл 3 раза в день. Дозирование препарата производится с помощью мерного стаканчика. Курс лечения определяется тяжестью заболевания, минимальный курс лечения должен составлять 1 неделю. Для закрепления терапевтического эффекта рекомендуется после исчезновения симптомов болезни продолжить лечение еще в течение 2-3 дней. При отсутствии улучшения состояния, необходимо обратиться к врачу. Перед употреблением взбалтывать!

Противопоказания

Повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата, дефицит сахарозы/изомальтозы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение при беременности и в период грудного вскармливания В связи с недостаточностью данных по безопасности применения препарата беременными и кормящими женщинами, указанной группе пациентов принимать препарат не рекомендуется.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции и реакции индивидуальной непереносимости. Очень редко при применении препарата может наблюдаться слабительный эффект (вследствие содержания сорбита). При появлении побочных эффектов, неописанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

Передозировка

Прием дозы, значительно превышающей предписанную дневную дозу (больше, чем в 3 раза), может вызвать тошноту, рвоту и диарею. В этом случае пациент должен обратиться к врачу. Лечение: отмена препарата; симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания

Препарат не содержит алкоголя, сахара и красителей. В процессе хранения возможно легкое помутнение раствора для приема внутрь и незначительные изменения вкуса, что не влияет на терапевтическое действие препарата. Информация для пациентов с сахарным диабетом: 2,5 мл раствора для приема внутрь содержат 0,963 г сорбитола, что соответствует 0,08 хлебной единицы (ХЕ). Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Условия хранения

от 2# до 25#