# Инструкция по применению
# Проспан Сироп саше 5 мл 21 шт

## Характеристики

Форма выпуска: Саше
Страна: Россия
Производитель: Энгельхард Арцнайметтель
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Плюща листьев экстракт
Количество в упаковке: 21
Дозировка действующего вещества: 7 мг/мл




## Описание

Прозрачная жидкость светло-коричневого цвета с характерным запахом. Допускается наличие легкой опалесценции.

## Действующее вещество

Плюща листьев экстракт

## Состав

В 5 мл препарата содержится: активный компонент: плюща обыкновенного листьев экстракт сухой, экстрагент - этанол 30% (5 -7,5 : 1) - 35,000 мг, вспомогательные вещества: вода очищенная - 2837,650 мг, калия сорбат - 6,700 мг, лимонная кислота безводная - 2,500 мг, сорбитол жидкий кристаллизирующийся - 2750,00 мг, камедь ксантановая - 12,500 мг, ароматизатор Фрескофорт Пермасил - 1,695 мг, ароматизатор апельсиновый (натуральный) - 3,955 мг, левоментол - 1,000 мг.

## Форма выпуска

Саше

## Фармакокинетика

Поскольку препарат представляет собой сухой экстракт листьев плюща и содержит комплекс биологически активных веществ, проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

**Показания**

В качестве отхаркивающего средства в терапии острых и хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.

**Способ применения и дозы**

Внутрь. Взрослым и детям старше 6 лет принимать содержимое 1 пакетика (5 мл) 3 раза в день. Курс лечения определяется тяжестью заболевания, минимальный курс лечения должен составлять 1 неделю. Для закрепления терапевтического эффекта рекомендуется после исчезновения симптомов болезни продолжить лечение еще в течение 2-3 дней. При отсутствии улучшения состояния необходимо обратиться к врачу. Слегка размять пакетик перед применением.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата, дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо- галактозная мальабсорбция, детский возраст (до 6 лет).

**Применение при беременности и кормлении грудью**

В связи с недостаточностью данных по безопасности применения препарата беременными и кормящими женщинами, указанной группе пациентов принимать препарат не рекомендуется.

**Побочные действия**

Возможны аллергические реакции и реакции индивидуальной непереносимости. Описаны редкие случаи возникновения тошноты и боли в эпигастральной области. Очень редко при применении препарата может наблюдаться слабительный эффект (вследствие содержания сорбитола). При появлении побочных эффектов, неописанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

**Передозировка**

Прием дозы, значительно превышающей предписанную дневную дозу (больше, чем в 3 раза) может вызвать тошноту, рвоту и диарею. В этом случае пациент должен обратиться к врачу. Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

**Особые указания**

Препарат не содержит алкоголя, сахара и красителей. В процессе хранения возможно легкое помутнение сиропа и незначительные изменения вкуса, что не влияет на терапевтическое действие препарата. Информация для пациентов с сахарным диабетом: 5 мл сиропа содержат 1,926 г сорбитола, что соответствует 0,16 хлебной единицы (ХЕ).Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

**Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.