Инструкция по применению
Проспан Сироп флакон 200 мл

Характеристики



Форма выпуска: Сироп
Страна: Германия
Производитель: Энгельхард Арцнайметтель
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Плюща листьев экстракт
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36

Действующее вещество

Плюща листьев экстракт

Состав

Действующее вещество: сухой экстракт листьев плюща. Вспомогательные вещества: очищенная вода 566, 66 мг. калия сорбат 1, 34 мг. лимонная кислота безводная 0, 50 мг. раствор сорбитола (кристаллизованный) 550,00 мг. камедь ксантана 1, 50 мг. вишневый аромат 3, 00 мг. Концентрация действующего вещества (мг): 7 мг

Форма выпуска

Сироп

Фармакокинетика

Фармакокинетика Бетаметазона натрия фосфат хорошо растворим и после внутримышечного введения быстро подвергается гидролизу и практически сразу абсорбируется из места введения, что обеспечивает быстрое начало терапевтического действия. Практически полностью выводится в течение одного дня после введения. Бетаметазона дипропионат медленно абсорбируется из депо, метаболизируется постепенно, что обуславливает длительное действие препарата, и выводится в течение более чем 10 дней. Бетаматезон хорошо связывается с белками плазмы (62,5%). Метаболизируется в печени с образованием преимущественно неактивных метаболитов. Выводится преимущественно почками.

Показания

В качестве отхаркивающего средства в терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и легких, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.

Способ применения и дозы

Внутрь, детям 1–6 лет , по 1 ч. ложке (2, 5 мл) 3 раза в сутки, школьникам и подросткам , по 2 ч. ложки 3 раза в сутки, взрослым , по 2–3 ч. ложки 3 раза в сутки. Курс лечения в легких случаях , 1 неделя, после исчезновения симптомов заболевания еще в течение 2–3 дней.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст (до 1 года). алкоголизм и другие состояния, при которых противопоказан прием алкоголя.

Применение при беременности и кормлении грудью

Так как не проводились исследования с целью выяснить возможность применения препарата в период беременности и кормления грудью, препарат можно применять только после предварительной консультации с врачом.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Прием дозы, значительно превышающей предписанную дневную дозу (больше, чем в 3 раза) может вызвать тошноту, рвоту и диарею. В этом случае пациент должен обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания

Препарат содержит 47 об. % алкоголя. Не содержит сахара, консервантов и красителей. В процессе хранения возможно легкое помутнение жидкости, образование осадка и незначительные изменения вкуса, что не влияет на терапевтическое действие препарата.

Условия хранения

В сухом месте