Инструкция по применению
Просталамин Классик Таблетки 40 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Герофарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Просталамин Классик. Биорегулятор предстательной железыПри хроническом простатите, аденоме простаты и проблем с зачатием.Предстательная железа расположена у мужчин ниже мочевого пузыря, через нее проходит начальная часть мочеиспускательного канала, а выводные протоки железы открываются в мочеиспускательный канал. Образное выражение «простата – второе сердце мужчины» вполне соответствует той роли, которую она играет в жизни каждого мужчины. Основные функции предстательной железы это: Продукция части семенной жидкости, около 30% объема эякулята вырабатывает простата, Участие в механизме выброса спермы во время полового акта, Участие в механизмах удержания мочи. Простата является также одним из производителей простагландинов – веществ, принимающих участие в осуществлении белкового и углеводного обмена, поддержании тонуса гладкой мускулатуры. Вопреки распространенному мнению предстательная железа не имеет непосредственного влияния на механизм эрекции, однако многие болезни простаты могут опосредованно вызывать нарушения эректильной функции. Наиболее частые заболевания предстательной железы – это ее воспаления – острый или хронический простатит (им страдают от 30 до 85% мужчин старше 25 лет), а также болезнь более старшего возраста – доброкачественная гиперплазия простаты или аденома (по статистике у мужчин в возрасте 60 лет вероятность развития аденомы 60%, а к 80 годам этот риск возрастает до 80%). К факторам риска воспалений предстательной железы относят: Частое заражение инфекциями, передаваемыми половым путем, Сидячая работа и малоподвижный образ жизни, что приводит к возникновению в венах малого таза застойных явлений,

Ослабленная иммунная система (из-за переутомления, стресса, недосыпания, неполноценного или нерегулярного питания и т.д.), Злоупотребление курением, алкоголем, прием наркотиков, Хронические травмы промежности (часто встречается у автомобилистов), Общее переохлаждение организма, Частые запоры, Нерегулярная половая жизнь, длительное половое воздержание,К факторам риска развития аденомы простаты относят: Возраст старше 50 лет, Наследственную предрасположенность, Неблагоприятную экологическая ситуация, Избыточный вес, Потребление большого количества животных жиров.Как сохранить здоровье простаты? Изменения в предстательной железе могут появляться на клеточном уровне без сопутствующих симптомов уже после 30-летнего возраста. Для того, чтобы клетки простаты функционировали правильно, им, как и каждой клетке нашего организма нужны особые белки (протеины), которые формируют структуру клетки и участвуют в ее обменных процессах. Как удалось установить благодаря открытию, сделанному в 1999 году Гюнтером Блобелом, который получил за свою научную работу Нобелевскую премию, протеины контролируют процессы межклеточного взаимодействия и определяют способность к самовосстановлению клетки. Недостаток пептидов (с возрастом или при патологии) ускоряет износ тканей, процессы старения и приводит к развитию заболеваний. Как действует Просталамин Классик? Просталамин Классик получен из ферментно-эндокринного сырья, и представляет собой комплекс белков и нуклеопротеидов, которые идентичны таковым у человека. Белки и нуклеопротеиды, входящие в состав Просталамин Классик, специфичны для предстательной железы, они обладают избирательным действием на ее клетки и способствуют нормализации функций предстательной железы и тонуса мочевого пузыря.Благодаря механизму трансцитоза поступающий белок в неизмененном виде оказывается в клетке - цели. В данном случае целью являются клетки предстательной железы. Попадая в них, Просталамин Классик насыщает клетки оптимальным белковым «рационом», позволяя им быстрее восстанавливаться и нормализовать выполнение своих функций – обеспечение мужского здоровья.Клинические испытания Просталамин Классик проводились у 110 больных с хроническим простатитом и аденомой предстательной железы.Установлено, что в ходе курсового применения Просталамин Классик большинство пациентов отмечали значительное улучшение общего состояния и специфических проявлений заболевания. Значительно уменьшалась выраженность болевого синдрома, исчезали расстройства мочеиспускания, улучшалось качество эрекции, увеличивалась продолжительность полового акта. Объективно определялась тенденция к восстановлению размеров и консистенции предстательной железы. Лабораторным методом установлена нормализация характеристик секрета предстательной железы.

Состав

Каждая таблетка 0,155 г содержит:лактоза (наполнитель), просталамин порошок (комплекс полипептидов и нуклеиновых кислот, полученный из предстательной железы крупного рогатого скота), дисперсия сополимера метакриловой кислоты (кишечно-растворимое покрытие), сахар-песок (загуститель), крахмал картофельный (разрыхлитель), кальция стеарат (агент антислеживающий), пропиленгликоль (эмульгатор).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Рекомендуется для нормализации и улучшения функции предстательной железы и мочеполовой системы.Просталамин Классик рекомендован к применению при следующих состояниях, таких как: Острый и хронический простатит Доброкачественная гиперплазия (аденома) предстательной железы Нарушения мочеиспускания Расстройства половой функции Пред- и послеоперационный период при операциях на предстательной железе Нарушения сперматогенеза Олигоспермия Задержка пубертатного развития у мальчиков Мужчинам старшего и пожилого возраста для поддержания функции предстательной железы

Способ применения и дозы

Просталамин Классик рекомендуется принимать по 1-3 таблетки за 10–15 минут до еды 2-3 раза в день в течение 10-15 дней. Повторный курс через 3-6 месяцев. Длительность и периодичность курсов могут быть скорректированы по согласованию с лечащим врачом. Просталамин Классик не имеет противопоказаний и может использоваться как самостоятельно, так и в рамках комплексной терапии.

Особые указания

Биологически активная добавка (БАД) к пищеНе является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

Хранить в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 5 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.