Инструкция по применению
Цитамины Просталамин Таблетки 10 мг 40 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: ВТФ
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 40
Срок годности: 36.0



Описание

Цитамины - белки, витамины, минеральные вещества, полученные по оригинальной технологии производства из органов и тканей животных.Как работают?Белковый коктейль из цитамина переносится в клетку-цель, где она потребляет всё, что ей необходимо.РезультатКлетка восстанавливает свои функции, орган начинает работать лучше.Благодаря оптимизации клеточного метаболизма прием цитаминов повышает устойчивость организма к болезнетворным агентам любого происхождения. Применение цитаминов способствует нормализации функции органов и систем организма, оптимизации защитных механизмов, что помогает предупредить возникновение заболевании.Просталамин - биорегулятор предстательной железы, рекомендуется для нормализации и улучшения функции предстательной железы и мочеполовой системы.Просталамин рекомендован к применению при следующих состояниях, таких как:Острый и хронический простатитДоброкачественная гиперплазия (аденома) предстательной железыНарушения мочеиспусканияРасстройства половой функцииПред- и послеоперационный период при операциях на предстательной железеНарушения сперматогенезаОлигоспермияЗадержка пубертатного развития у мальчиковМужчинам старшего и пожилого возраста для поддержания функции предстательной железы.

Состав

Просталамин, Е 470, крахмал картофельный, лактоза, сахар, Е 461, кишечно-растворимое покрытие.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Для реализации населению через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети в качестве биологически активной добавки к пище - источника полипептидов и нуклеиновых кислот.

Способ применения и дозы

Взрослым по 1-3 таб. 2-3 раза в день, за 10-15 мин. до еды, не разжёвывая. Продолжительность приёма 10-14 дней.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью.Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

При комнатной температуре