Инструкция по применению
Простатекс Суппозитории ректальные 10 мг 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Россия
Производитель: Герофарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Простаты экстракт
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 10 мг



Описание

От белого до белого с желтоватым или серовато-бурым оттенком цвета, торпедообразной формы, однородной консистенции, допускается появление белого налета на поверхности суппозитория и наличие на продольном срезе воздушного стержня или воронкообразного углубления.

Действующее вещество

Простаты экстракт

Состав

Действующее вещество: простаты экстракт - 50 мг, в пересчете на водорастворимые пептиды - 10 мг, вспомогательные вещества: жир твердый (марки Suppocire NA 15) - достаточное количество до получения суппозитория массой 1,25 г.

Форма выпуска

Суппозитории

Показания

Хронический простатит. Состояния до и после оперативных вмешательств на предстательной железе.

Способ применения и дозы

Ректально, по суппозиторию после самопроизвольного опорожнения кишечника или клизмы раз в день. После введения суппозитория желательно пребывание пациента в постели в течение 30-40 минут. Длительность курса лечения препаратом Простатекс - не менее 10 дней. При необходимости возможно проведение повторных курсов. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные действия

Аллергические реакции. Если любые из указанных выше побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Особые указания

Применяют только для лечения взрослых мужчин, не применяют у женщин и детей. Лечение хронического простатита должно быть комплексным, предполагающим наряду с назначением препарата Простатекс применение других групп лекарственных препаратов и немедикаментозных методов лечения. До начала лечения хронического простатита и, при необходимости, в процессе лечения рекомендуется проводить анализ секрета предстательной железы. В период применения препарата для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы следует регулярно посещать врача для проведения стандартного контроля данного заболевания. Прежде чем начать курс лечения необходимо убедиться, что патология носит доброкачественный характер. Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных действий (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).