Инструкция по применению
Простатилен АЦ Суппозитории ректальные 30 мг + 180 мг 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Россия
Производитель: Цитомед
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Простаты экстракт+Цинка аргинил-глицинат
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 30 мг+ 180 мг

Описание

Суппозитории торпедообразной формы от белого до жёлтого цвета. На срезе допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления.

Действующее вещество

Простаты экстракт+Цинка аргинил-глицинат

Состав

На 1 суппозиторий: активные вещества: простаты экстракт (Простатилен®)* 0,03 г, цинка аргинил-глицината дигидрохлорид (в пересчете на цинка аргинил-глицинат) 0,18 г, вспомогательные вещества: парафин жидкий 0,06 г, жир твёрдый (Витепсол или Эстарам, марки W 35) достаточное количество для получения суппозитория массой 1,9 г. * субстанция Простатилен® представляет собой простаты экстракт с добавлением глицина. Примечание: сырьё для производства субстанции Простатилен® получают из хозяйств, в которых отсутствуют заболевания животных вирусной, прионовой, бактериальной и микоплазменной этиологии.

Форма выпуска

Суппозитории

Фармакокинетика

Пептиды экстракта простаты в тканях расщепляются клеточными протеазами до аминокислот которые участвуют в процессе синтеза тканеспецифических белков и других биологически активных соединений. Хелатный комплекс цинка аргинил-глицината дигидрохлорид расщепляется на цинк аргинин и глицин с их последующим метаболизмом. Препарат кумулятивным действием не обладает.

Показания

Простатилен АЦ показан к применению у взрослых старше 18 лет при: нарушениях сперматогенеза, характеризующихся повышенной степенью фрагментации ДНК сперматозоидов на фоне перенесённых заболеваний мужских половых органов инфекционно-воспалительной и травматической природы; хроническом простатите (в составе комплексной терапии), в том числе с нарушением сперматогенеза и эректильной функции; состояния до и после оперативных вмешательств на предстательной железе; доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение через 20 дней после начала лечения, необходимо обратиться к врачу.

Способ применения и дозы

Ректально. По 1 суппозиторию вводят глубоко в задний проход после дефекации или очистительной клизмы 1 раз в сутки. После введения суппозитория пациенту рекомендован покой в положении лёжа в течение 30 минут для лучшего всасывания компонентов препарата. Курс лечения не менее 10 дней. Максимальная продолжительность лечения 20 дней. Повторный курс возможен не ранее чем через 4 недели после окончания предыдущего. Принимайте препарат только согласно тому способу применения и в тех дозах которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, - детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

У женщин препарат не применяется.

Побочные действия

Возможно: кратковременный зуд и жжение в прямой кишке проходящие самостоятельно и не требующие назначения дополнительной терапии, аллергические реакции, послабление стула. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаев передозировки не наблюдалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Возможно одновременное применение с антибактериальными и противовоспалительными препаратами.

Особые указания

В период применения препарата не рекомендуется использовать слабительные средства и средства для мониторной очистки кишечника. Препарат не имеет особенностей действия при первом приёме и при его отмене и особых действий врача и пациента не требует. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций

Условия хранения

При температуре от 2 до 15 °С. Хранить в недоступном для детей месте.