Инструкция по применению
Простатилен Суппозитории ректальные 30 мг 5 шт

Характеристики

Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Россия
Производитель: Цитомед
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Простаты экстракт
Количество в упаковке: 5
Дозировка действующего вещества: 30 мг



Действующее вещество

Простаты экстракт

Состав

В 1 суппозитории: экстракт простаты* 30 мг . цинка аргинил-глицината дигидрохлорид (в пересчете на аргинил-глицинат) 180 мг Вспомогательные вещества: парафин жидкий - 60 мг, жир твердый (Витепсол или Эстарам, марки W35) - достаточное количество для получения суппозитория массой 1.9 г.

Форма выпуска

Суппозитории

Показания

Хронический простатит, в т.ч. с нарушением сперматогенеза и эректильной функции . состояния до и после оперативных вмешательств на предстательной железе . доброкачественная гиперплазия предстательной железы.

Способ применения и дозы

Суппозитории вводят ректально по 1 шт. 1 раз/сут. Суппозиторий вводят глубоко в задний проход после дефекации или очистительной клизмы. После введения суппозитория пациенту рекомендован покой в положении лежа в течение 30 мин для лучшего всасывания компонентов препарата. Курс лечения не менее - 10 дней. Максимальная продолжительность лечения - 20 дней. Повторный курс возможен не ранее, чем через 4 недели после окончания предыдущего. Препарат следует использовать только согласно указанному способу применения в рекомендуемых дозах.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата . детский возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

В период применения препарата не рекомендуется использовать слабительные средства и средства для очистки кишечника перед проведением диагностических исследований. Препарат не имеет особенностей действия при первом приеме и при его отмене и особых действий врача и пациента не требует. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами: Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Побочные действия

Возможно: кратковременный зуд и жжение в прямой кишке, проходящие самостоятельно и не требующие назначения дополнительной терапии . аллергические реакции . послабление стула. Если любые из указанных выше побочных эффектов усугубляются, или появились любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, пациент должен сообщить об этом врачу.

Особые указания

Возможно: кратковременный зуд и жжение в прямой кишке, проходящие самостоятельно и не требующие назначения дополнительной терапии . аллергические реакции . послабление стула. Если любые из указанных выше побочных эффектов усугубляются, или появились любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, пациент должен сообщить об этом врачу.