Инструкция по применению
Простатилен Суппозитории ректальные 50 мг 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Россия
Производитель: Цитомед
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Простаты экстракт
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 50 мг

Действующее вещество

Простаты экстракт

Состав

В 1 суппозитории: экстракт простаты 50 мг . субстанция Простатилен представляет собой экстракт простаты с добавлением глицина. Вспомогательные вещества: диметилсульфоксид - 90 мг, макрогол 1500 - достаточное количество для получения суппозитория массой 2.8 г.

Форма выпуска

Суппозитории

Показания

Препарат животного происхождения. Обладает органотропным действием на предстательную железу. Уменьшает степень отека, лейкоцитарной инфильтрации предстательной железы, нормализует секреторную функцию эпителиальных клеток, увеличивает число лецитиновых зерен в секрете ацинусов, стимулирует мышечный тонус мочевого пузыря. Уменьшает тромбообразование, обладает антиагрегантной активностью, препятствует развитию тромбоза венул в предстательной железе.

Способ применения и дозы

Хронический абактериальный простатит . — состояния до и после оперативных вмешательств на предстательной железе . — доброкачественная гиперплазия предстательной железы.

Противопоказания

Суппозитории вводят ректально по 1 шт. (50 мг) 1 раз/сут (утром или вечером). Суппозиторий вводят глубоко в задний проход после дефекации или очистительной клизмы. Перед применением суппозиторий следует смочить водой. После введения желательно пребывание больного в постели в течение 30-40 минут. Курс лечения - не менее 10 дней при хроническом простатите, не менее 15 дней - при доброкачественной гиперплазии предстательной железы.

Применение при беременности и кормлении грудью

Аллергические реакции: крапивница. В случае возникновения аллергических реакций следует прекратить лечение, назначить антигистаминные препараты.

Побочные действия

Меры предосторожности

Особые указания

Меры предосторожности