Инструкция по применению
Простопин суппозитории ректальные 15 шт

Характеристики

Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Россия
Производитель: АПФ-Трейдинг
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Маточное молочко+Перга+Прополис+Пыльца цветочная
Количество в упаковке: 15
Срок годности: 24



Действующее вещество

Маточное молочко+Перга+Прополис+Пыльца цветочная

Состав

Действующее вещество: Маточное молочко 100 мг ,мед 120 мг ,перга 150 мг,прополис 310 мг,пыльца цветочная 80 мг

Форма выпуска

Суппозитории

Показания

Трещины заднего прохода;— геморрой;— простатит.

Способ применения и дозы

По 1 суппозиторию 1 раз в сутки (на ночь, после очистительной клизмы или естественного опорожнения кишечника).Курс лечения - 15-30 дней; при необходимости повторяют через 2-3 мес.

Противопоказания

Гиперчувствительность.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендовано применение Простопина у беременных, кормящих женщин в связи с отсутствием клинических данных его применения.

Побочные действия

Аллергические реакции.

Передозировка

Случаев передозировки Простопином не зафиксировано.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимого взаимодействия Простопина с прочими лекарственными средствами не выявлено.

Особые указания

Простопин не нарушает скорости мыслительных процессов, поэтому может применяться у лиц, деятельность которых связана с точными механизмами и вождением автотранспорта.

Условия хранения

Беречь от детей