Инструкция по применению
Простосорб 25 г

Характеристики



Форма выпуска: Порошок
Страна: Россия
Производитель: Флора Кавказа
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Кремния диоксид коллоидный
Количество в упаковке: 1

Описание

Лёгкий белый или белый с голубоватым оттенком аморфный порошок, без запаха. При взбалтывании с водой образует суспензию от белого до почти белого цвета.

Действующее вещество

Кремния диоксид коллоидный

Состав

Каждый грамм лекарственного препарата содержит:действующее вещество – кремния диоксид коллоидный 1,0 г

Форма выпуска

Порошок

Фармакокинетика

Простосорб не расщепляется и не всасывается в желудочно-кишечном тракте и выделяется в неизменном виде.

Способ применения и дозы

Простосорб принимают внутрь только в виде водной суспензии!Для получения суспензии необходимое количество препарата тщательно размешивают в 1/4-1/2

стакана воды. Рекомендуется готовить свежую суспензию перед каждым приемом препарата и выпивать ее за 1 час до еды или приема других лекарств.Средняя суточная доза у взрослых 0,1- 0,2 г на 1 кг массы тела (6-12 г).Препарат принимается в 3-4 приема в течение суток.Максимальная суточная доза у взрослых 0,33 г на 1 кг массы тела (20 г).Доза для детей рассчитывается в зависимости от массы тела (см. таблицу).Таблица рекомендуемых доз препарата ПростосорбВес пациента//Дозировка //Объем водыдо 10 кг//0,5-1,5 чайные ложки в сутки//30-50 мл11-20 кг//1 чайная ложка «без горки» на 1 прием//30-50 мл21-30 кг//1 чайная ложка «с горкой» на 1 прием//50-70 мл31-40 кг//2 чайные ложки «с горкой» на 1 прием//70-100 мл41-60 кг //1 столовая ложка «с горкой» на 1 прием//100 млболее 60 кг//1-2 столовые ложки «с горкой» на 1 прием//100-150 мл1 чайная ложка «с горкой» – 1 грамм препарата1 столовая ложка «с горкой» – 2,5-3 грамма препарата.В случаях пищевой аллергии препарат принимается непосредственно перед приемом пищи, суточную дозу Простосорб разделяют в течение дня на три приема.Длительность лечения зависит от диагноза и тяжести заболевания, курс лечения при острых интоксикациях 3-5 дней, при аллергических заболеваниях, хронических интоксикациях продолжительность лечения до 10-14 дней. Повторные курсы спустя 2-3 недели, по рекомендации врача. Особенности применения препарата Простосорб при различных заболеваниях1. Пищевая токсикоинфекция и острые отравления.Начинать терапию рекомендуется с промывания желудка 0,5-1% суспензией Простосорб. При тяжелых отравлениях в первые сутки промывание желудка проводят через зонд каждые 4-6 часов, наряду с этим препарат дают внутрь. Разовая доза у взрослых может составлять 0,1-0,15 г/кг массы тела больного по 2-3 раза в день.2. Острые кишечные инфекции.Рекомендуется начать лечение препаратом Простосорб в первые часы или сутки заболевания в комплексе с другими способами лечения. В первые сутки суточная доза дается в течение 5-ти часов с интервалами между приемами в 1 час. Во 2-е сутки суточная доза дается в 4 приема в течение суток. Продолжительность лечения 3-5 дней.3. Лечение вирусного гепатита.В комплексной терапии вирусного гепатита Простосорб применяют как детоксицирующее средство в обычных дозах в течение первых 7-10 дней болезни.4. Аллергические заболевания.При острых аллергических реакциях лекарственного или пищевого генеза рекомендуется предварительное промывание желудка и кишечника 0,5-1% суспензией Простосорб. Затем препарат дают в обычных дозах до наступления клинического эффекта. При хронических пищевых аллергиях рекомендуются курсы Простосорб по 7-10-15 дней, препарат принимают непосредственно перед едой. Аналогичные курсы показаны при острой рецидивирующей крапивнице и отеке Квинке, эозинофилии, накануне на фоне обострения поллинозов и других атопий.5. Хроническая почечная недостаточность. Используют курсы лечения препаратом Простосорб в суточной дозе 0,15-0,2 г/кг тела в течение 25-30 дней с перерывом 2-3 недели.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата Простосорб при беременности и в период грудного вскармливания не противопоказано.

Побочные действия

Редко – аллергические реакции, диспепсия, запоры.При длительном, более 14 дней, приеме Простосорб возможно нарушение всасывания витаминов, кальция, в связи с чем рекомендуется профилактический прием поливитаминных препаратов, кальция.

Передозировка

Случаев передозировки при применении препарата Простосорб в рекомендуемых терапевтических дозах не выявлено.

Взаимодействие с другими препаратами

Возможно снижение лечебного эффекта одновременно принимаемых внутрь лекарств.

Особые указания

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмамиНе отмечено влияние препарата Простосорб на способность управлять транспортными средствами или другими потенциально опасными механизмами.