Инструкция по применению
Простоурит Суппозитории ректальные 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Россия
Производитель: Усолье-Сибирский Химфармзавод
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Маточное молочко+Перга+Прополис+Пыльца цветочная
Количество в упаковке: 10



Описание

Суппозитории от зеленовато-желтого до зеленовато-коричневого цвета с темными вкраплениями торпедообразной формы, с характерным запахом.

Действующее вещество

Маточное молочко+Перга+Прополис+Пыльца цветочная

Состав

Состав на один суппозиторий: Активные компоненты: Прополис – 0,31 г, перга – 0,15 г, апилак (молочко маточное пчелиное) – 0,10 г, пыльца цветочная (обножка) – 0,08 г, мед натуральный – 0,12 г. Вспомогательные вещества: воск пчелиный – 0,06 г, ланолин безводный – 0,12 г, масло какао – 1,91 г.

Форма выпуска

Суппозитории

Показания

Препарат рекомендуется в комплексной терапии для лечения хронического простатита, геморроя и трещин анального отверстия.

Способ применения и дозы

Ректально, по 1 суппозиторию после самопроизвольного опорожнения кишечника или клизмы 1 раз в день на ночь. Длительность курса лечения – 15-30 дней. При необходимости возможно проведение повторного курса через 2-3 месяца после консультации с врачом. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, в том числе к продуктам пчеловодства, диарея, беременность, период грудного вскармливая, детский возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных по безопасности и эффективности в данной возрастной группе).

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

В настоящее время случаи передозировки не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

ПРОСТОУРИТ может применяться в комплексной терапии. Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

Особые указания

Перед применением препарата следует проконсультироваться с врачом. Во избежание передозировки, рекомендуется соблюдать режим дозирования препарата. Если при применении препарата симптомы сохраняются без улучшения более 1 недели или ухудшаются, следует обратиться к врачу. Лечение хронического простатита должно быть комплексным, предполагающим наряду с назначением препарата применение других групп лекарственных препаратов и немедикаментозных методов лечения. До начала лечения хронического простатита рекомендуется проводить анализ секрета предстательной железы. Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Условия хранения

При температуре от 2 °С до 8 °С. Хранить в недоступном для детей месте.