Инструкция по применению
Протамина сульфат раствор 10 мг/мл 5 мл 5 шт

Характеристики

Форма выпуска: Ампулы
Страна: Россия
Производитель: Эллара
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Протамина сульфат
Количество в упаковке: 5



Описание

Антидот гепарина

Действующее вещество

Протамина сульфат

Состав

Протамина сульфат 10 мг

Форма выпуска

Ампулы

Фармакокинетика

После в/в введения образуется комплекс протамин-гепарин, который, по-видимому, разрушается в жировой ткани с высвобождением гепарина.

Показания

Передозировка гепарина (гипергепаринемия, кровотечения), перед операцией у больных, которые принимают гепарин с лечебной целью, после операций на сердце и кровеносных сосудах с экстракорпоральным кровообращением.

Способ применения и дозы

Вводят в/в струйно медленно или капельно под контролем свертываемости крови. При передозировке гепарина струйно вводят со скоростью 1 мл 1% раствора за 2 мин. В случае необходимости инъекции повторяют с интервалами 15-30 мин, общая доза обычно составляет 5 мл 1% раствора. Максимальная доза составляет 150 мг/ч. При кровотечениях суточная доза составляет 5-8 мг/кг, в/в капельно вводят в 2 приема с интервалом 6 ч.

Противопоказания

Идиопатическая или врожденная гипергепаринемия, выраженная артериальная гипотензия, тромбоцитопения, недостаточность коры надпочечников.

Применение при беременности и кормлении грудью

Хорошо контролируемых экспериментальных и клинических исследований безопасности применения протамина сульфата при беременности не проводилось. Неизвестно, выделяется ли протамина сульфат с грудным молоком. При беременности и в период лактации применение возможно с осторожностью и только в случаях крайней необходимости.

Побочные действия

Со стороны сердечно-сосудистой системы: брадикардия, артериальная гипотензия. Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота. Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд. Прочие: ощущение жара, гиперемия кожи, чувство нехватки воздуха (при чрезмерно быстром введении).

Взаимодействие с другими препаратами

Протамина сульфат - антагонист низкомолекулярных гепаринов. При одновременном применении с протамина сульфатом возможно повышение интенсивности и длительности действия недеполяризующих миорелаксантов.

Особые указания

При передозировке может снижать свертываемость крови, т.к. сам обладает антикоагулянтной активностью.

Условия хранения

Беречь от детей. При комнатной температуре.