Инструкция по применению
Протаргол Раствор 2% флакон-капельница 10 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Тверская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Состав

Действующее вещество: Серебра протеинат (Протаргол субстанция порошок) - 0,20г или Серебра протеинат (Протаргол субстанция- раствор) - 0,20г (в пересчете на сухой Протаргол) вспомогательное вещество: Вода очищенная - до 10 мл.

Форма выпуска

Раствор

Фармакокинетика

При местном применении практически не адсорбируется.

Показания

Симптоматическая терапия острого назофарингита (насморка), синусита.

Способ применения и дозы

Местно. Перед применением препарата рекомендуется промыть и очистить носовые ходы. Взрослым и детям старше 6 лет: по 2-3 капли в каждый носовой ход 3 раза в день. Детям в возрасте от 3 до 6 лет: по 1-2 капли в каждый носовой ход 3 раза в день в течение 5-7дней. Действие препарата проявляется через 2-3 дня. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, атрофический ринит. Детский возраст до 3-х лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

При применении препарата возможны следующие нежелательные явления: аллергические реакции (кожный зуд, крапивница), ощущение жжения, раздражения и онемения слизистой носа, сухость во рту, покраснение глаз, атопический дерматит, отек Квинке, анафиликтический шок. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна. При чрезмерном применении возможно усиление побочных эффектов в виде раздражения, жжения слизистой оболочки носа, зуда кожи. При случайном приеме препарата внутрь возможно раздражение желудочно-кишечного тракта. Лечение: симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Соли цинка, меди, свинца, серебра, ртути, железа, алюминия образуют с раствором серебра протеината нерастворимые осадки, серебра протеинат инактивируется солями алколоидов и органическими основаниями (эпинефрин). Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать применение этого препарата, так как она содержит важную для Вас информацию. Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться вновь. Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу. Лекарственное средство, которым Вы лечитесь предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас. При усугублении любых из указанных в инструкции побочных эффектов лечение следует прекратить. Возможно окрашивание отделяемого из носа в серый или синий цвет. Не следует превышать рекомендованные дозы, особенно у детей и пожилых людей.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Беречь от детей.