Инструкция по применению
Протаргол-ЛОР Таблетки для приготовления раствора для местного применения 2 % 1 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармстандарт
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Серебра протеинат
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 2%
Срок годности: 2.0



Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки от коричневого до темно-коричневого или почти черного цвета с синеватым оттенком с неравномерной окраской поверхности.

Действующее вещество

Серебра протеинат

Состав

Действующее вещество: серебра протеинат (протаргол) – 200,0 мг. Вспомогательное вещество: гидроксипропилметилцеллюлоза – 10,0 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

При местном применении практически не абсорбируется.

Показания

Симптоматическая терапия острого назофарингита (насморка), синусита.

Способ применения и дозы

Местно в виде 2 % раствора. Способ приготовления 2% раствора: 1\. Поместить одну таблетку Протаргол - ЛОР во флакон из темного стекла. 2\. Влить во флакон 10 мл (до уровня «плечиков» – сужения флакона Протаргол -ЛОР) кипяченой воды (предварительно охлажденной до комнатной температуры) или воды для инъекций. Во избежание неправильного дозирования препарата рекомендуется использовать флакон из темного стекла и крышку-пипетку препарата Протаргол – ЛОР. Протаргол – ЛОР может выпускаться без флакона и крышки-пипетки. 3\. Закрыть флакон крышкой-пипеткой, интенсивно встряхивать в течение 5 минут, затем оставить на 10 минут и затем снова интенсивно встряхивать в течение 5 минут. Таблетка должна раствориться полностью. При использовании препарата Протаргол – ЛОР без флакона и крышки-пипетки в упаковке, для приготовления 2% раствора вам дополнительно понадобятся флакон из темного стекла, крышка-пипетка. Готовый раствор хранить не более 30 дней в защищенном от света месте при температуре не выше 25°С. Флакон и крышку-пипетку можно использовать повторно. При повторном использовании очистить флакон и крышку-пипетку: тщательно промыть горячей проточной водой в течение 2-3 минут до визуальной чистоты крышки-пипетки и воды после промывки, далее ополоснуть кипяченой водой. Перед применением препарата Протаргол - ЛОР рекомендуется промыть и очистить носовые ходы. Взрослым и детям старше 6 лет по 2-3 капли в каждый носовой ход 3 раза в день Детям от 3 до 6 лет: по 1-2 капли в каждый носовой ход 3 раза в день в течение 5-7 дней

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, атрофический ринит, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 3 лет (для данной дозировки).

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Побочные действия

Аллергические реакции: кожный зуд, раздражение слизистой, крапивница, ощущение жжения и онемения, сухость во рту, покраснение глаз, анафилактический шок, отек Квинке, атопический дерматит. При усугублении любых из указанных в инструкции побочных эффектов препарат следует отменить. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: при рекомендуемом способе применения передозировка маловероятна. Возможно усиление побочных эффектов. При случайном проглатывании большого количества препарата может возникнуть раздражение желудочно-кишечного тракта. При длительном бесконтрольном применении препарата теоретически возможно появление очень редкого заболевания – аргироза (окрашивание в серый или синеватый цвет кожи и слизистых). При соблюдении рекомендованного режима дозирования, риск возникновения аргироза маловероятен. Лечение. При сильном раздражении, жжении, зуде глаз, кожу, слизистые оболочки промыть большим количеством воды в течение 15 минут. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Фармакодинамическое, фармакокинетическое взаимодействие: не изучено. Фармацевтическое взаимодействие: соли цинка, меди, свинца, серебра, ртути, железа, алюминия образуют с раствором серебра протеината нерастворимые осадки раствор серебра протеината инактивируется солями алкалоидов и органическими основаниями (эпинефрин). Если вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата Протаргол - Лор проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Возможно окрашивание отделяемого из носа в серый или синий цвет. Внимательно прочтите инструкцию по применению перед тем, как начать использование препарата. Сохраните инструкцию, она может понадобиться вновь. Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу. Лекарственное средство, которым Вы лечитесь, предназначено лично Вам, и его не следует передавать другим лицам, поскольку оно может причинить им вред даже при наличии тех же симптомов, что и у Вас.

Срок хранения после открытия

Готовый раствор хранить не более 30 дней в защищенном от света месте при температуре не выше 25°С.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 С. Готовый раствор в защищенном от света месте при температуре не выше 25 оС. Хранить в недоступном для детей месте.