Инструкция по применению
Прото-Венол Капсулы 30 шт



Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Франция
Производитель: Beaufour Ipsen Industrie
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гептаминол+Гинкго двулопастного листьев экстракт+Троксерутин
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 14 мг+300 мг+300 мг

Описание

Твердые желатиновые капсулы, корпус - желтого цвета, крышечка - зеленого. Содержимое капсул - частично спрессованный порошок светло-желтого цвета.

Действующее вещество

Гептаминол+Гинкго двулопастного листьев экстракт+Троксерутин

Состав

Состав на 1 капсулуДействующие вещества:Гинкго двулопастного листьев экстракт сухой стандартизованный(EGb 761 ’) с содержанием суммы флавонолгликозидов 24,0 % исуммы терпеновых лактонов 6,0 % 14,0 мгГептаминола гидрохлорид 300,0 мгТроксерутин 300,0 мгВспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный, магния стеарат, корпус капсулы (краситель железа оксид желтый (E172), титана диоксид (E171), желатин), крышечка капсулы (краситель железа оксид желтый (E172), индигокармин (E132), титана диоксид (E171), желатин)

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Гептаминола гидрохлорид: при приеме внутрь хорошо всасывается, имеет высокую биодоступность (80-90 %). Cmax достигается в течение 1,8 ч. Период полувыведения из плазмы составляет 2,5-2,7 часа. Метаболизм отсутствует, выведение происходит с мочой в течение 24 часов.Гинкго двулопастного листьев экстракт сухой стандартизованный (EGb 761®): исследования проводились для лактоновых терпенов (гинкголиды A и B, билобалид). При приеме внутрь хорошо всасываются, имеют высокую биодоступность (80-90 %). Cmax достигается через 1-2 часа. Период полувыведения из плазмы составляет 3- 4 часа для гинколида A, 4-6 часов для гинколида B и 2-3 часа для билобалида. Троксерутин: при приеме внутрь хорошо всасывается. Cmax достигается через 2-3 часа. Метаболизируется в печени. Метаболизм медленный, выведение происходит в основном (65 %) через желчь и фекалии.

Показания

Симптоматическая терапия проявлений хронической лимфовенозной недостаточности, таких как тяжесть в ногах, боль в ногах, парестезия,Острый геморрой.

Способ применения и дозы

Внутрь, во время еды. Капсулы проглатывают целиком, запивая достаточным количеством воды.Симптоматическая терапия проявлений хронической лимфовенозной недостаточности, таких как тяжесть в ногах, боль в ногах, парестезия: по 1 капсуле 2 раза в сутки (утро, вечер), в течение 1-3 месяцев.Острый геморрой: по 2 капсулы 2 раза в сутки (утро, вечер), в течение 7 дней.Если после лечения не наступает улучшение или усугубляются симптомы, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата,- Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения,- Хронический гастрит в фазе обострения,- Острый инфаркт миокарда,- Острое нарушение мозгового кровообращения,- Гипертиреоидизм,- Одновременное назначение с ингибиторами МАО (моноаминоксидаза) из-за риска повышения артериального давления,- Беременность и период грудного вскармливания,- Возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

БеременностьОпыты на животных не выявили никакого тератогенного действия. Исследования на людях во время первого триместра беременности не проводились, поэтому риск возникновения подобного действия неизвестен. До настоящего времени не было обнаружено врожденных мальформаций.ЛактацияНеизвестно, проникает ли препарат в молоко матери, поэтому не рекомендуется принимать препарат во время лактации.

Побочные действия

Данные по безопасности, полученные в ходе клинических испытаний (около 15 000 пациентов) и постмаркетингового наблюдения, показывают, что нежелательные реакции, как правило, очень редки и по степени тяжести относятся к несерьезным. Нежелательные реакции, для которых установлена возможная связь с лечением хотя бы однократно, перечислены ниже по системно-органным классам и частоте возникновения. Частота нежелательных реакций классифицируется как очень часто (>1 /10), часто (>1/100, 1/1000, 1/10000, Нарушения со стороны нервной системы:Очень редко: головная боль.Нарушения со стороны сердца:Ч астота неизвестна: артериальная гипертензия.Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта:Озень редко: боль в верхней части живота, ощущение дискомфорта в эпигастральной области, тошнота, диарея.Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей:Очень редко: анафилактические реакции, такие как ангионевротический отек, крапивница, кожный зуд, кожная сыпь, аллергический дерматит (экзематозный дерматит).Если у Вас возникли нежелательные реакции, необходимо обратиться к врачу.

Передозировка

Возможно повышение артериального давления, тахикардия, тошнота, головная боль, приливы крови к лицу.При наличии симптомов передозировки следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. Лечение - симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Гептаминола гидрохлоридПротивопоказано одновременное применение с ингибиторами МАО из-за риска гипертонического криза.Гинкго двулопастный листьев экстрактОдновременный прием антикоагулянтов (фенпрокумон, варфарин) илиАнтитромбоцитарных препаратов (клопидогрел, ацетилсалициловаякислота и другие нестероидные противовоспалительные препараты)может изменить действие этих препаратов. Исследования, проведенные сварфарином, не выявили взаимодействия между варфарином и препаратами, содержащими гинкго двулопастного листьев экстракт. Тем не менее, рекомендуется проводить наблюдение при одновременном лечении данными препаратами в начале терапии, по ее окончании, а также при изменении дозы или смене препарата.Исследование взаимодействия с лекарственным средством талинолол показало, что гинкго двулопастный может ингибировать Р-гликопротеины на уровне кишечника. Это может увеличить действие чувствительных к Р-гликопротеину лекарственных средств в кишечнике, таких как дабигатран этексилат. При одновременном применении препаратов, содержащих гинкго двулопастный и дабигатран, необходимо принять меры предосторожности.Исследование взаимодействия с лекарственным средством нифедипин показало, что при одновременном приеме может увеличиваться. Максимальная концентрация нифедипина в плазме и у некоторых пациентов достигать 100 %, что может стать причиной нежелательных реакций, связанных с приемом нифедипина (головокружение, гиперемия лица с ощущением жара).Не рекомендуется одновременный прием с препаратом эфавиренз, концентрация эфавиренза в плазме может уменьшаться вследствиеиндукции цитохрома CYP3A4.Не рекомендуется применение у пациентов, постоянно принимающих тиазидные диуретики, противосудорожные лекарственные препараты, а также во время лечения гентамицином.ТроксерутинПри одновременном применении усиливает действие аскорбиновой кислоты на структуру и проницаемость сосудистой стенки.Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Прото-Венол проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Гептаминола гидрохлоридПациентам с тяжелой формой артериальной гипертензии необходимо контролировать артериальное давление в начале лечения.Гинкго двулопастный листьев экстрактПациентам, имеющим предрасположенность к кровотечениям (геморрагическая предрасположенность) и проходящим сопутствующую антикоагулянтную и антитромбоцитарную терапию, необходимо проконсультироваться с врачом перед приемом препарата.Прием препарата может увеличить предрасположенность к кровотечению. В качестве меры предосторожности при плановом хирургическом вмешательстве прием препарата следует прекратить за 3-4 дня до операции.Прием препарата может способствовать возникновению эпилептических приступов у пациентов, страдающих эпилепсией.- Острый геморрой: прием препарата не исключает назначение специфического лечения других заболеваний анальной области. Лечение препаратом должно быть кратковременным. Если симптомы не исчезают в течение короткого периода (7 дней), необходимо провести проктологическое обследование и пересмотреть лечение.- Нарушение венозного кровообращения нижних конечностей: препарат имеет наибольшую эффективность в случае соблюдения пациентом здорового образа жизни:- Следует избегать пребывания на солнце, воздействия жары, длительного пребывай гя в положении стоя, лишнего веса.- Длительная ходьба и использование подходящих компрессионных чулок способствуют улучшению венозного кровообращения. Вниманию спортсменов: препарат содержит активный компонент - гептаминола гидрохлорид, который может дать положительный результат анализа при допинг-контроле.Не превышайте рекомендуемые дозы и сроки лечения при самостоятельном применении препарата. Если после лечения не наступает улучшение или усугубляются симптомы, или появляются новые симптомы, необходимо обратиться к врачу.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Отсутствуют данные о влиянии препарата на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Условия хранения

Гептаминола гидрохлоридПротивопоказано одновременное применение с ингибиторами МАО из-за риска гипертонического криза.Гинкго двулопастный листьев экстрактОдновременный прием антикоагулянтов (фенпрокумон, варфарин) илиАнтитромбоцитарных препаратов (клопидогрел, ацетилсалициловаякислота и другие нестероидные противовоспалительные препараты)может изменить действие этих препаратов. Исследования, проведенные сварфарином, не выявили взаимодействия между варфарином и препаратами, содержащими гинкго двулопастного листьев экстракт. Тем не менее, рекомендуется проводить наблюдение при одновременном лечении данными препаратами в начале терапии, по ее окончании, а также при изменении дозы или смене препарата.Исследование взаимодействия с лекарственным средством талинолол показало, что гинкго двулопастный может ингибировать Р-гликопротеины на уровне кишечника. Это может увеличить действие чувствительных к Р-гликопротеину лекарственных средств в кишечнике, таких как дабигатран этексилат. При одновременном применении препаратов, содержащих гинкго двулопастный и дабигатран, необходимо принять меры предосторожности.Исследование взаимодействия с лекарственным средством нифедипин показало, что при одновременном приеме может увеличиваться. Максимальная концентрация нифедипина в плазме и у некоторых пациентов достигать 100 %, что может стать причиной нежелательных реакций, связанных с приемом нифедипина (головокружение, гиперемия лица с ощущением жара).Не рекомендуется одновременный прием с препаратом эфавиренз, концентрация эфавиренза в плазме может уменьшаться вследствиеиндукции цитохрома CYP3A4.Не рекомендуется применение у пациентов, постоянно принимающих тиазидные диуретики, противосудорожные лекарственные препараты, а также во время лечения гентамицином.ТроксерутинПри одновременном применении усиливает действие аскорбиновой кислоты на структуру и проницаемость сосудистой стенки.Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Прото-Венол проконсультируйтесь с врачом.