Инструкция по применению
Провера Таблетки 500 мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Италия
Производитель: Пфайзер
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Медроксипрогестерон
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 500 мг
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Медроксипрогестерон

Состав

Таблетки 1 таб. медроксипрогестерон (в форме ацетата) 500 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Связывание с белками плазмы составляет 90-95%. Проникает через ГЭБ, выделяется с грудным молоком. Метаболизируется в печени. T1/2 составляет около 30 ч. Выводится с желчью и с мочой в виде метаболитов и в неизмененном виде.

Показания

Рецидивы и/или метастазы рака эндометрия. Рецидивы и/или метастазы гормонально-зависимых форм рака молочной железы. Рецидивы и/или метастазы рака почки. Метастатический рак простаты. Синдром анорексии и кахексии.

Способ применения и дозы

Устанавливают индивидуально, в зависимости от показаний, стадии заболевания, схемы терапии.

Противопоказания

Беременность, повышенная чувствительность к медроксипрогестерону.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан при беременности. Не влияет на лактацию. Выделяется с грудным молоком в незначительном количестве, при этом отрицательных явлений в развитии детей, получающих это молоко, не наблюдается.

Побочные действия

Со стороны ЦНС: головная боль, раздражительность, нарушения сна, сонливость, чувство усталости, депрессия, головокружение. Со стороны пищеварительной системы: тошнота. Аллергические реакции: крапивница, зуд, сыпь, анафилактоидные реакции. Со стороны системы кроветворения: тромбоэмболические нарушения. Со стороны эндокринной системы: повышенная чувствительность молочной железы, галакторея, эрозия и изменение секреции шейки матки. При применении в дозе 500 мг /сут и более возможны акне, гирсутизм, увеличение массы тела, "лунообразное" лицо. Прочие: гипертермия.

Особые указания

Необходимо строго соблюдать соответствие используемой лекарственной формы препарата показаниям к применению. С особой осторожностью медроксипрогестерон следует применять у пациентов с тромбофлебитом, тромбоэмболическими осложнениями, тяжелыми нарушениями функции печени, гиперкальциемией. Перед применением медроксипрогестерона для лечения гинекологических заболеваний и контрацепции необходимо исключить наличие у пациентки опухоли половых органов или молочных желез. При проведении патогистологического исследования определенных органов и тканей необходимо предупредить гистолога о предыдущем лечении прогестагенами. На фоне применения медроксипрогестерона возможны изменения результатов следующих исследований: определение уровня гонадотропинов определение уровня прогестерона, кортизола, тестостерона (у мужчин), эстрогенов (у женщин) в плазме крови определение уровня прегнандиола в моче проведение пробы с сахарной нагрузкой проведение теста с метапироном.

Условия хранения

В сухом месте