
Инструкция по применению
Псило-бальзам Гель для наружного применения 1 % 20 г

Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Россия
Производитель: Нижфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Дифенгидрамин
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1%
Срок годности: 36.0



Описание

Бесцветный прозрачный однородный гель

Действующее вещество

Дифенгидрамин

Состав

1 г геля содержит: действующее вещество: дифенгидрамина гидрохлорид — 10,0 мг, вспомогательные вещества: цетилпиридиния хлорид — 1,0 мг, макрогол глицерилкаприлокапрат — 150,0 мг, полиакриловая кислота — 12,0 мг, трометамол — 22,2 мг, вода — до 1 г.

Форма выпуска

Гель

Фармакокинетика

При местном применении абсорбция незначительная, нарушение целостности кожных покровов повышает всасывание препарата.

Показания

Солнечные ожоги и ожоги I степени, укусы насекомых, крапивница, кожный зуд различного происхождения (за исключением зуда при холестазе): зудящие дерматозы, экзема, ветряная оспа, аллергические раздражения кожи, контактные дерматиты, вызванные соприкосновением с растениями.

Способ применения и дозы

Наружно. Взрослым и детям старше 2 лет Псило-Бальзам® наносят на пораженные участки кожи (полоску геля длиной 3-5 см. на площадь поражения размером с ладонь) 3-4 раза в день и распределяют его легкими массирующими движениями.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, одновременное применение любых препаратов, содержащих дифенгидрамин, применение на обширных поверхностях кожи, детский возраст до 2-х лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и лактации требует оценки потенциальной пользы для матери и возможного риска для плода и ребенка.

Побочные действия

Редко — реакции гиперчувствительности кожи (экзема, контактный дерматит). При наружном применении препарата побочных эффектов системного характера не отмечено.

Передозировка

Симптомы: покраснение, умеренная отечность участка кожи, на который наносился препарат. Лечение: промыть водой участок кожи, на который наносился препарат.

Взаимодействие с другими препаратами

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами при применении наружных форм дифенгидрамина не описаны.

Особые указания

Сразу после нанесения Псило-Бальзама® (в течение 1-2 часов) следует избегать длительного пребывания на солнце, чтобы избежать риска развития фотодерматозов. Во время лечения Псило-Бальзамом® следует избегать употребления алкоголя.

Условия хранения

В сухом месте