Инструкция по применению
Псорилом гранулы гомеопатические 30 г

Характеристики

Форма выпуска: Гранулы
Страна: Россия
Производитель: Алкой
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1



Описание

Однородные гранулы правильной шаровидной формы, белого с серым или кремовым оттенком цвета, без запаха.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

Активные компоненты: Berberis vulgaris (Berberis) (берберис вульгарис (берберис)) D3, Graphites (графитес) D8, Toxicodendron quercifolium (Rhus toxicodendron) (токсикодендрон кверцифолиум (рус токсикодендрон)) D12, Fumaria officinalis (фумария оффициналис) D3, Solidago virgaurea (солидаго виргаурея) D3, Kalium bromatum (калиум броматум) D6.Вспомогательные компоненты: Гранулы сахарные 100,0 г

Форма выпуска

Гранулы

Показания

В комплексной терапии псориаза. Монотерапия псориаза с ограниченной площадью поражений поверхности менее 20 %.

Способ применения и дозы

По 8 гранул 3 раза в день под язык до полного растворения за полчаса до еды или через 1 час после еды.Курс лечения 2-3 месяца. При необходимости курс можно повторить с интервалом в 1 месяц.При обострении принимать в растворенном виде (8 гранул на один стакан воды) по 1 чайной ложке 5-6 раз в день до стихания острых симптомов, далее в прежнем режиме.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата. Возраст до 18 лет, беременность и период грудного вскармливания.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. До настоящего времени информация о случаях побочных эффектов не поступала.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы

Взаимодействие с другими препаратами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

При приеме гомеопатических препаратов может отмечаться временное обострение симптомов. В этом случае следует обратиться к врачу.При отсутствии терапевтического эффекта в течение 30 дней, а также появлении побочных эффектов, следует обратиться к врачу.Информация для больных сахарным диабетом - прием рекомендованной суточной дозы препарата в гранулах сахарных составляет 0,114 хлебной единицы.Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмамиНе влияет

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.