Инструкция по применению
Псорилом Таблетки подъязычные гомеопатические 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Алкой
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1



Описание

Таблетки плоскоцилиндрической формы белого, белого с сероватым или белого с желтоватым оттенком цвета с фаской и риской.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

Состав на 1 таблетку: Активные компоненты: *Berberis vulgaris (Berberis) (берберис вульгарис (берберис)) D3 *Graphites (графитес) D8 *Toxicodendron quercifolium (Rhus toxicodendron) (токсикодендрон кверцифолиум (рус токсикодендрон)) D12 *Fumaria officinalis (фумария оффициналис) D3 *Solidago virgaurea (солидаго виргаурея) D3 *Kalium bromatum (калиум броматум) D6 Вспомогательные вещества: крахмал картофельный 15 мг кальция стеарат 3 мг лактозы моногидрат до 300 мг

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В комплексной терапии псориаза.

Способ применения и дозы

По 1 таблетке 3 раза в день под язык до полного растворения за полчаса до еды или через 1 час после еды. Курс лечения 2-3 месяца. После каждого месяца приема препарата следует сделать недельный перерыв. При необходимости курс можно повторить через 1 месяц. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата. Возраст до 18 лет. Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. Если у вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

При приеме гомеопатических препаратов может отмечаться временное обострение симптомов. В этом случае следует обратиться к врачу. При проявлении побочных эффектов, следует обратиться к врачу. Информация для пациентов с сахарным диабетом: содержание углеводов в максимальной суточной дозе препарата соответствует 0,074 хлебные единицы. При сохранении симптомов заболевания или ухудшения состояния на фоне применения препарата в течение 14 дней следует сообщить об этом лечащему врачу.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.