Инструкция по применению
Псоринохель Н Раствор для инъекций 1,1 мл 5шт

Характеристики

Форма выпуска: Ампулы
Страна: Германия
Производитель: Heel
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 5



Описание

Биорегуляционный немецкий препарат. Применяется для лечения экземы.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

(на 1 ампулу 1,1 мл (=1,1 г)) Активные компоненты: Psorinum-Nosode (Псоринум-Нозод) D10 1,1 мкл, Medorrhinum-Nosode (Медорринум-Нозод) D12 1,1 мкл, Sulfur (Сульфур) D6 1,1 мкл, Thuja occidentalis (Туя окциденталис) D6 1,1 мкл, Bufo bufo (Буфо буфо) D10 1,1 мкл, Natrium chloratum (Натриум хлоратум) D12 1,1 мкл, Vaccininum-Nosode (Вакцининум-Нозод) D8 1,1 мкл, Bismutum kalium iodidum (Бисмутум калиум йодидум) D5 0,55 мкл, Nerium oleander (Нериум олеандер) D4 0,55 мкл, Cicuta virosa (Цикута вироза) D5 0,55 мкл, Bacillinum humanum-Nosode (Бациллинум гуманум-Нозод) D12 0,55 мкл, Вспомогательные вещества: вода для инъекций 1090,10 мг, натрия хлорид для установления изотонии q.s.

Форма выпуска

Ампулы

Показания

Препарат применяется для лечения экземы.

Способ применения и дозы

Препарат назначается внутримышечно по 1,1 мл через день в течение 4 недель. Увеличение продолжительности и проведение повторного курса лечения возможно по назначению врача.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно с учетом предполагаемой пользы для матери и потенциального риска для плода и младенца.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Назначение комплексных гомеопатических лекарственных средств не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. При отсутствии терапевтического эффекта, а также при появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 30°С. Хранить в недоступном для детей месте! 5 лет. Не применять по истечении срока годности.