Инструкция по применению
Пульмо Хеверт Таблетки 40 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Германия
Производитель: ГИАНТЕРА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 40
Срок годности: 36.0

Описание

Таблетки круглой формы, двояковыпуклые, желтовато-серого цвета с гравировкой с обеих сторон.Таблетки для рассасывания гомеопатические. По 10 таблеток в блистер из пленки ПВХ и алюминиевой фольги. По 4 блистера вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

1 таблетка содержитДействующие вещества:Drosera (Росянка) D3 100 мгGrindelia robusta (Гринделия мощная) D4 10 мгKalium iodatum (Калия йодид) D3 20 мгNaphthalinum (Нафталин) D6 20 мгSpongia (Губка греческая) D4 20 мгSticta (Стикта или Лобария легочная) D3 20 мгTeucrium scorodonia (Дубровник чесночный) D3 20 мгVerbascum (Коровяк густоцветковый) D1 20 мгYerba santa (Эриодиктион калифорнийский) D1 20 мгВспомогательные вещества:магния стеарат 1 мг, крахмал кукурузный 7,5 мг, лактоза моногидрат

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В составе комплексной терапии для уменьшения симптомов при воспалительных процессах верхних и нижних дыхательных путей, а также для симптоматического лечения кашля при остром и хроническом бронхите, тонзиллите, фарингите, трахеите, ларингите, рините, синусите.

Способ применения и дозы

Положить таблетку под язык и держать до полного растворения. Принимать препарат следует за 20-30 минут до или после приема пищи.При острой стадии заболевания: взрослым и детям старше 12 лет - по 1 таблетке каждые 30 минут - 1 час (но не более 6 таблеток в день) в течение 7 дней. Увеличение курса терапии при необходимости - по рекомендации врачаПри хроническом течении заболевания: по 1 таблетке 1-3 раза в день. Продолжительность курса лечения по назначению врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, заболевания щитовидной железы, наследственная непереносимость галактозы, генетический дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, детский возраст до 12 лет (эффективность и безопасность применения не установлена).Применение при беременности и лактацииПрименение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Побочные действия

Возможны (крайне редко) аллергические реакции.Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Прием гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

Приём гомеопатических препаратов может временно усугубить заболевание (первоначальное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.В случае отсутствия улучшения при остром течении заболевания по истечении 3 дней препарат следует отменить и обратиться к врачу. Влияние на способносгь управлять транспортными средствами и работать с механизмамиНе влияет.ПередозировкаСлучаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Условия хранения

В сухом месте