Инструкция по применению
Пульсатилла композитум Раствор для инъекций Ампулы 2,2 мл 5 шт

Характеристики



Форма выпуска: Ампулы
Страна: Германия
Производитель: Heel
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 5

Описание

Биорегуляционный немецкий препарат. Применяется в комплексной терапии гипогалактии.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

(на одну ампулу 2,2 мл (=2,2 г)): Активные компоненты: Pulsatilla pratensis (Pulsatilla) (пульсатилла пратенсис (пульсатилла)) D6 22 мкл, Sulfur (сульфур) D8 22 мкл, Cortisonum aceticum (Cortisonacetat) (кортизонум ацетикум (кортизонацетат)) D18 22 мкл, Вспомогательные вещества: вода для инъекций 2134 мг, натрия хлорид для установления изотонии.

Форма выпуска

Ампулы

Показания

Гипогалактия (в комплексной терапии).

Способ применения и дозы

Кратность и продолжительность лечения устанавливает лечащий врач индивидуально или по 1 ампуле 1-3 раза в неделю внутримышечно. Курс лечения – 2 недели.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, в редких случаях - головокружение. В этих случаях применение препарата следует прекратить и обратиться к врачу.

Передозировка

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить применение препарата и обратиться к лечащему врачу. При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции, следует обратиться к врачу.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте! 5 лет. Не применять по истечении срока годности.