Инструкция по применению
Пумпан Капли гомеопатические 20 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Австрия
Производитель: Биттнер Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

100 мл содержат: Crataegus D1 - 20 мл Arnica D6 - 10 мл Kalium carbonicum D6 - 10 мл Digitalis D12 - 10 мл Convallaria D12 - 10 мл вспомогательные вещества: этанол 43% по весу. 20, 50 или 100 мл во флаконах темного стекла в комплекте с капельницей, 1 флакон в картонной пачке.

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Действие препарата Пумпан является результатом совокупного действия его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

Показания

В составе комплексной терапии при:Хронической ишемической болезни сердца. Артериальной гипертензии.Дистрофических изменениях миокарда.Сердечной недостаточности.Вегето-сосудистой дистонии.

Способ применения и дозы

При хронической ишемической болезни сердца взрослым назначают по 1 таб. или 10 капель 3 раза/сут. Длительность лечения - 1-2 мес. При стабилизации состояния переходят на поддерживающую терапию 1-2 раза/сут. При артериальной гипертензии взрослым и подросткам назначают по 1 таб. или 10 капель 3 раза/сут. Длительность лечения - 2-3 мес. Затем назначают поддерживающую терапию 1-2 раза/сут под контролем АД. При сердечной недостаточности, дистрофических изменениях миокарда взрослым и подросткам назначают по 1 таб. или 10 капель, детям до 12 лет - по 1/2 таб. или 5 капель 3 раза/сут. Длительность лечения - 2-3 мес. Затем назначают поддерживающую терапию 1-2 раза/сут. При вегето-сосудистой дистонии взрослым и подросткам назначают по 1 таб. или 10 капель 3 раза/сут. Длительность лечения - 2-3 мес. Затем назначают поддерживающую терапию 1-2 раза/сут. В острых случаях препарат назначают каждые 0.5-1 ч, но не более 8 раз/сут. После улучшения состояния препарат назначают 3 раза/сут. Препарат принимают за 30 мин до или через 1 ч после приема пищи. Капли принимают в чистом виде или разводят в 1 столовой ложке воды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием. Таблетку следует держать под языком до полного рассасывания.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Вопрос о применении препарата Пумпан при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) решается врачом индивидуально.

Побочные действия

Редко: повышенное слюноотделение.Пациент должен быть информирован о том, что при возникновении других побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимое лекарственное взаимодействие препарата Пумпан с другими лекарственными средствами не установлено.

Особые указания

Поскольку препарат Пумпан в форме капель гомеопатических содержит растительные природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное помутнение раствора или ослабление запаха и вкуса, что не приводит к снижению эффективности препарата.

Условия хранения

В сухом месте