Инструкция по применению
Пустырник Форте Таблетки 500 мг 40 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Эвалар
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 40
Срок годности: 24.0



Состав

Активные компоненты: пустырника экстракт сухой с содержанием суммы флавоноидов в пересчете на рутин 1,0 % - 50,0 мг, магния аспарагината тетрагидрат - 250,0 мг (эквивалентно содержанию магния 17 мг), пиридоксина гидрохлорид (витамин B6) — 1,0 мг. Вспомогательные компоненты: целлюлоза микрокристаллическая - 170,9 мг, мальтодекстрин- 37,3 мг, кроскармеллоза натрия - 27,5 мг, кремния диоксид коллоидный - 5,5 мг, кальция стеарат - 4,1 мг, крахмал картофельный - 3,7 мг. Вспомогательные компоненты оболочки таблетки: гипромеллоза (гидроксипропилметил- целлюлоза) - 8,7 мг, титана диоксид - 6,28 мг, макрогол-4000 (полиэтиленгликоль 4000) - 4,83 мг, тальк-0,19 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Невротические и неврозоподобные реакции, сопровождающиеся повышенной нервной возбудимостью, раздражительностью, тревогой, страхом, Расстройства сна (бессонница), проявляющиеся нарушением засыпания, прерывистым поверхностным сном, преждевременным пробуждением, В составе комплексной терапии при нейроциркуляторной дистонии.

Способ применения и дозы

Внутрь по 1 таблетке 2 раза в день во время еды. При расстройствах сна: внутрь по 1 таблетке за 30 минут до сна. Курс лечения определяется врачом с учетом течения заболевания и составляет до 4 недель. Повторные курсы лечения возможны по рекомендации врача.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, детский возраст до 18 лет, фенилкетонурия, выраженная почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 30 мл/минуту). Препарат не рекомендуется к применению у детей до 18 лет из-за отсутствия клинических исследований.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат не рекомендуется принимать во время беременности и в период грудного вскармливания, в связи с отсутствием достаточного опыта клинического применения у данной категории пациентов.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции к компонентам препарата, диспепсия (боли в животе, тошнота, изжога, метеоризм, диарея, запор). В случае возникновения каких-либо нежелательных явлений применение препарата следует прекратить и обратиться к лечащему врачу.

Передозировка

Возможные симптомы передозировки: ощущение усталости, головокружение, тремор рук, боль в животе спастического характера. При возникновении вышеуказанных симптомов необходимо провести промывание желудка и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат усиливает действие снотворных средств и других лекарственных препаратов, угнетающих центральную нервную систему, гипотензивных препаратов. Одновременное применение препаратов, содержащих фосфаты или соли кальция, может значительно уменьшать всасывание магния в желудочно-кишечном тракте. Препараты магния снижают всасывание тетрациклина, рекомендуется принимать препарат с интервалом 3 часа после приема антибиотика. Магний ослабляет действие пероральных тромболитических средств, уменьшает усвоение железа. Пиридоксина гидрохлорид (витамин Вб) угнетает активность Леводопы.

Особые указания

Перед тем как начать применение препарата, следует проконсультироваться с лечащим врачом. При приеме препарата у пациентов с нарушением функции почек необходим контроль за концентрацией магния в сыворотке крови.

Условия хранения

В сухом месте