# Инструкция по применению
# Пустырник-Реневал Настойка 25 мл

## Характеристики

Форма выпуска: Настойка
Страна: Россия
Производитель: Обновление ПФК АО
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Пустырника травы экстракт
Количество в упаковке: 1




## Описание

Прозрачная жидкость зеленовато-коричневого цвета со слабым характерным запахом.

## Действующее вещество

Пустырника травы экстракт

## Состав

Пустырника трава-200г Этанол(спирт этиловый) 70%-до получения 1000 мл настойки

## Форма выпуска

Настойка

## Показания

Повышенная нервная возбудимость, нарушение сна, неврастения, нейроциркуляторная дистония.

**Способ применения и дозы**

Внутрь за 30 минут до еды. Взрослым и детям старше 12 лет по 30-50 капель настойки разведенных в 1/4 стакана воды, 3-4 раза в день. Курс лечения - 3-4 недели. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта (фаза обострения), беременность, период лактации, детский возраст (до 12 лет).

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Применение препарата противопоказано во время беременности и в период грудного вскармливания.

**Побочные действия**

Возможны аллергические реакции, диспепсия. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

**Передозировка**

При применении препарата в соответствии с инструкцией по применению передозировка маловероятна. При превышении дозы возможно усиление побочных эффектов. При передозировке показана симптоматическая терапия.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Усиливает действие снотворных и анальгезирующих средств. Перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом.

**Особые указания**

Содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата 0,55 г, в максимальной суточной дозе 2,2 г.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Условия хранения**

В пачке при температуре не выше 25 оС. Хранить в недоступном для детей месте.