
Инструкция по применению
Пустырника экстракт Таблетки 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Усолье-Сибирский Химфармзавод
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Пустырника травы экстракт
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 14 мг

Описание

Таблетки круглые, плоскоцилиндрической формы с риской с одной стороны и фасками с двух сторон. От светло-серого с коричневатым оттенком до светло-коричневого цвета с более темными и более светлыми вкраплениями. Со слабым характерным запахом.

Действующее вещество

Пустырника травы экстракт

Состав

На одну таблетку: Активный компонент: пустырника травы экстракт - 14,0 мг Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат (сахар молочный) - 120,0 мг, целлюлоза микрокристаллическая (тип 101) - 60,0 мг, крахмал картофельный - 40,0 мг, карбоксиметилкрахмал натрия - 10,0 мг, сахароза - 132,5 мг, магния стеарат-3,5 мг. Масса таблетки - 380 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Повышенная нервная возбудимость, неврастения, бессонница, нейроциркуляторная дистония.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослым и детям старше 12 лет по 1 таблетке 3-4 раза в день за час до еды. Курс лечения -3-4 недели. Проведение повторного курса возможно по рекомендации врача.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность, язвенные поражения желудочно-кишечного тракта (в том числе язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в фазе обострения), артериальная гипотензия, дефицит сахарозы/изомальтозы, непереносимость фруктозы, глюко-галактозная мальабсорбция. Беременность, период грудного вскармливания Детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Прием препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказан.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, диспепсия.

Передозировка

Случаи передозировки не выявлены.

Взаимодействие с другими препаратами

Совместим с другими седативными и кардиологическими препаратами, усиливает действие снотворных и анальгезирующих средств.

Особые указания

Больным сахарным диабетом следует учитывать, что 1 таблетка препарата содержит 0.01 ХЕ (углеводных единиц). При отсутствии эффекта при приеме препарата в течение 2-х недель следует обратиться к врачу.

Срок хранения после открытия

3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

При температуре не выше 25° С. Хранить в недоступном для детей месте.