Инструкция по применению
Рафамин Таблетки для рассасывания 20 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки для рассасывания
Страна: Россия
Производитель: МАТЕРИА МЕДИКА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Антитела к гамма интерферону аффинно очищенные
Количество в упаковке: 20



Описание

Таблетки плоскоцилиндрической формы, с риской и фаской, от белого до почти белого цвета. На плоской стороне с риской нанесена надпись MATERIA MEDICA, на другой плоской стороне нанесена надпись RAPHAMIN.

Действующее вещество

Антитела к гамма интерферону аффинно очищенные

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания

Показания

Лечение острых респираторных вирусных инфекций у взрослых пациентов.

Способ применения и дозы

Риска не предназначена для деления таблетки на части. Принимать внутрь – не во время приема пищи. Таблетку держать во рту до полного растворения. В 1-й день лечения принимают 8 таблеток по следующей схеме: по 1 таблетке каждые 30 минут в первые 2 часа (всего 5 таблеток за 2 часа), затем в течение этого же дня принимают еще по 1 таблетке 3 раза через равные промежутки времени. На 2-ой день и далее принимают по 1 таблетке 3 раза в день. Длительность лечения составляет 5 дней. При отсутствии положительного эффекта от проводимой в течение 5 дней терапии препаратом или ухудшении состояния следует обратиться к врачу.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Возраст до 12 лет. Непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Беременность и период грудного вскармливания.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания противопоказано (в связи с отсутствием клинических данных по эффективности и безопасности).

Особые указания

В состав препарата входит лактозы моногидрат, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с редкой врожденной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или глюкозо-галактозной мальабсорбцией.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. В течение периода применения препарата хранить контурную ячейковую упаковку в картонной пачке, предусмотренной производителем.