
Инструкция по применению
Рамни Таблетки жевательные 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки жевательные
Страна: Россия
Производитель: Татхимфармпрепараты
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Кальция карбонат+Магния карбонат
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 680 мг+80 мг

Описание

Круглые, плоскоцилиндрические таблетки белого или белого с кремовым оттенком цвета, с усиленной фаской, без риски, с запахом апельсина. Допускается легкая мраморность и незначительные вкрапления

Действующее вещество

Кальция карбонат+Магния карбонат

Состав

1 таблетка содержит: Действующие вещества: кальция карбонат - 680 мг, магния карбонат (магния карбонат основной) - 80 мг, Вспомогательные вещества: маннитол, повидон (коллидон 90 F), сахароза, ароматизатор апельсиновый, натрия стеарилфумарат, тальк.

Форма выпуска

Таблетки жевательные

Фармакокинетика

В результате взаимодействия препарата Рамни® с желудочным соком в желудке образуются растворимые соли кальция и магния. Уровень абсорбции кальция и магния из этих соединений зависит от дозы препарата. Максимальный уровень абсорбции - 10% кальция и 15-20% магния. Небольшое количество абсорбированного кальция и магния выводится через почки. При нарушении функции почек уровень концентрации кальция и магния в плазме может возрастать. В кишечнике из растворимых солей образуются нерастворимые соединения которые экскретируются с калом.

Показания

Симптомы связанные с повышенной кислотностью желудочного сока и рефлюкс-эзофагитом: изжога кислая отрыжка периодические боли в области желудка чувство переполнения или тяжести в эпигастральной области диспепсия (в том числе вызванные погрешностью в диете приемом лекарств злоупотреблением алкоголем кофе никотином) диспепсия беременных.

Способ применения и дозы

Внутрь. Взрослые и дети старше 12 лет: если врачом не рекомендовано иначе при появлении симптомов 1-2 таблетки разжевать (или держать во рту до полного растворения). При необходимости можно повторить прием препарата через 2 часа. Максимальная суточная доза - 11 таблеток.

Противопоказания

Тяжелая почечная недостаточность гиперкальциемия гипофосфатемия нефрокальциноз повышенная чувствительность к компонентам препарата дефицит сахаразы/изомальтазы непереносимость фруктозы глюкозо-галактозная мальабсорбция детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

При применении в рекомендованных дозах препарат не представляет опасности для плода или ребенка.

Побочные действия

При соблюдении рекомендованных доз препарат хорошо переносится тем не менее в очень редких случаях возможны аллергические реакции: сыпь отек Квинке анафилактические реакции.

Передозировка

Длительное применение препарата в высоких дозах у пациентов с нарушением функции почек может вызвать гипермагниемию гиперкальциемию алкалоз которые могут проявляться тошнотой рвотой мышечной слабостью. В этом случае следует отменить препарат и немедленно обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Изменение кислотности желудочного сока во время применения антацидов может привести к снижению скорости и степени абсорбции других препаратов при одновременном приеме поэтому лекарственные препараты следует принимать за 1-2 часа до или после приема антацидных препаратов. Антибиотики тетрациклинового ряда фторхинолоны сердечные гликозиды левотироксин препараты железа фториды фосфаты - при одновременном применении антациды снижают абсорбцию этих препаратов. Тиазидные диуретики - при одновременном приеме с антацидами следует регулярно контролировать концентрацию кальция в сыворотке крови.

Особые указания

При назначении препарата пациентам с нарушением функции почек следует регулярно контролировать концентрацию магния фосфора и кальция в сыворотке крови. Пациентам с нарушением функции почек не рекомендуется длительно принимать препарат в высоких дозах. Применение препарата Рамни® в высоких дозах может увеличить риск образования камней в почках. Указание пациентам с сахарным диабетом: 1 таблетка препарата Рамни® содержит 2953 мг сахарозы (003 ХЕ). Если применение препарата неэффективно следует обратиться к врачу за консультацией. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами работа с движущимися механизмами работа диспетчера и оператора).

Срок хранения после открытия

3 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.