Инструкция по применению
Ранкоф Таблетки 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки покрытые оболочкой
Страна: Россия
Производитель: Профит Фарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Кофеин+Парацетамол+Фенилэфрин+Хлорфенамин
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 500 мг+2 мг+30 мг+10 мг
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Кофеин+Парацетамол+Фенилэфрин+Хлорфенамин

Состав

Парацетамол – 500 мг, хлорфенамина малеат – 2 мг, кофеин – 30 мг, фенилэфрина гидрохлорид – 10 мг.

Форма выпуска

Таблетки покрытые оболочкой

Показания

Симптоматическое лечение «простудных» заболеваний, гриппа, ОРВИ, инфекционного и аллергического ринита (лихорадочный синдром, болевой синдром, ринорея).

Способ применения и дозы

Принимают внутрь, взрослым и детям старше 14 лет назначают по 1 таблетке Ранкофа с интервалом 4-6 часов, но не более 4 таблеток в сутки. Если не наблюдается облегчения симптомов в течение 3 дней после начала приема препарата, необходимо обратиться к врачу.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам препарата,- выраженный атеросклероз коронарных артерий,- повышение артериального давления,- сахарный диабет,- феохромоцитома,- беременность,- период лактации,- детский возраст до 14 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказания: беременность; период лактации.

Побочные действия

Аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек), тошнота, боль в области желудка; анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз. Повышенная возбудимость, головокружение, повышение артериального давления, нарушение засыпания. Мидриаз, парез аккомодации, повышение внутриглазного давления, сухость во рту, тошнота, рвота, эпигастральная боль; задержка мочи.При длительном применении в больших дозах - гепатотоксическое действие, гемолитическая или апластическая анемия, метгемоглобинемия, панцитопения; нефротоксичность (почечная колика, глюкозурия, интерстициальный нефрит, папиллярный некроз).Симптомы передозировки Ранкофа обусловлены действием входящих в его состав компонентов. В частности, при передозировке парацетамола (при приеме свыше 10-15 г) развиваются бледность кожных покровов, снижение аппетита, тошнота, рвота, токсический гепатит, вплоть до развития гепатонекроза, повышение активности печеночных трансаминаз, увеличение протромбинового времени. Проводят симптоматическое лечение, промывание желудка, назначают введение донаторов сульфгидрильных групп и предшественников синтеза глутатиона - метионина через 8-9 часов после передозировки и N- ацетилцистеина - через 12 часов.

Передозировка

Возможны аллергические реакции.При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Усиливает эффекты ингибиторов МАО, седативных лекарственных средств, алкоголя. Алкоголь усиливает седативное действие антигистаминных ЛС.Антидепрессанты, противопаркинсонические и антипсихотические ЛС, фенотиазиновые производные повышают риск развития задержки мочи, сухости во рту, запоров. Глюкокортикостероиды увеличивают риск развития глаукомы.Парацетамол снижает эффективность урикозурических ЛС.Хлорфенамин одновременно с ингибиторами МАО, фуразолидоном может привести к гипертоническому кризу, возбуждению, гиперпирексии.Трициклические антидепрессанты усиливают адреномиметическое действие фенилэфрина, одновременное назначение галотана повышает риск развития желудочковой аритмии.Снижает гипотензивное действие гуанетидина, который, в свою очередь, усиливает альфа-адреностимулирующую активность фенилэфрина.

Особые указания

В период лечения проводят контроль показателей периферической крови и функционального состояния печени.В период лечения необходимо воздерживаться от вождения автотранспорта и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.В период лечения Ранкофом нельзя употреблять алкоголь, принимать снотворные и анксиолитические ЛС (транквилизаторы). Не принимать вместе с другими лекарственными средствами, содержащими вещества входящие в состав препарата.Если симптомы заболевания не проходят в течение 3 дней, обратиться к врачу.

Условия хранения

В сухом темном месте