Инструкция по применению
Рапимед таблетки 100 мг 6 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки покрытые оболочкой
Страна: Исландия
Производитель: Актавис
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Суматриптан
Количество в упаковке: 6
Дозировка действующего вещества: 100 мг
Срок годности: 36.0



Действующее вещество

Суматриптан

Форма выпуска

Таблетки покрытые оболочкой

Показания

Состав1 таб.суматриптана сукцинат 70 мг, что соответствует содержанию суматриптана 50 мгВспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 70 мг, кроскармеллоза натрия - 6 мг, лактоза безводная (Pharmatose DCL 21) - 105.7 мг, целлюлоза микрокристаллическая (Авицел РН 102) - 45.3 мг, магния стеарат - 3 мг. Состав пленочной оболочки: лактозы моногидрат - 4.32 мг, маннитол - 2.76 мг, титана диоксид - 2.4 мг, тальк - 1.8 мг, триацетин - 0.72 мг.

Способ применения и дозы

ФармакокинетикаВсасываниеПосле приема внутрь быстро абсорбируется из ЖКТ. Через 45 мин концентрация суматриптана в плазме достигает 70% от Cmax. Биодоступность составляет 14% (за счет пресистемного метаболизма и неполного всасывания). После приема внутрь суматриптана в дозе 100 мг Cmax в плазме крови составляет 54 нг/мл.РаспределениеСвязывание с белками плазмы составляет 14-21%. Общий Vd - 170 л (2.4 л/кг).МетаболизмМетаболизируется путем окисления при участии МАО (преимущественно изофермента А) с образованием основного метаболита - индолуксусного аналога суматриптана, не обладающего фармакологической активностью в отношении серотониновых 5-НТ1- и 5-НТ2-рецепторов.ВыведениеТ1/2 суматриптана - около 2 ч. Плазменный клиренс - 1160 мл /мин, почечный клиренс - 260 мл/мин; внепочечный клиренс - 80% от общего клиренса.Выводится почками, преимущественно в виде метаболитов (97% после приема внутрь) - свободной кислоты или глюкуронидного конъюгата.

Побочные действия

мигрень (купирование приступов, с аурой или без нее).

Условия хранения

В защищенном от солнца помещении