Инструкция по применению
Раунатин таблетки покрытые оболочкой 2 мг 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки покрытые оболочкой
Страна: Россия
Производитель: Вифитех
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Раувольфии алкалоиды
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 2 мг
Срок годности: 36



Описание

Таблетки круглые двояковыпуклой формы, покрытые оболочкой, белого цвета.

Действующее вещество

Раувольфии алкалоиды

Состав

Состав на одну таблетку Активный компонент Раунатин (Раувольфии алкалоиды) в пересчете на 100 % содержание суммы алкалоидов–0,002 г Вспомогательные вещества ядра Сахар (сахароза)–0,0346 г Крахмал картофельный-0,0290 г Глюкозы моногидрат (декстрозы моногидрат)–0,0136 г Кальция стеарат– 0,0008 г Масса ядра–0,08 г   Вспомогательные вещества оболочки Сахар (сахароза)–0,0617012 г Магния карбонат основной (магния гидроксикарбонат) –0,0153066 г Поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский (повидон)–0,0010564 г Титана диоксид–0,0009680 г Аэросил (кремния диоксид коллоидный)–0,0008880 г Вазелиновое масло (парафин жидкий) –0,0000384 г Воск пчелиный–0,0000256 г Тальк–0,0000158 г Масса оболочки–0,08 г Масса таблетки, покрытой оболочкой–0,16 г

Форма выпуска

Таблетки покрытые оболочкой

Фармакокинетика

Хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта, но медленнее, чем резерпин, поэтому гипотензивное действие развивается постепенно. Выводится с калом приблизительно 60 % препарата, с мочой – 8%. Период полувыведения составляет 45-168 часов.

Показания

Артериальная гипертензия I степени тяжести.

Способ применения и дозы

Внутрь, после еды. Лечение должно проводиться под наблюдением врача. В первый день принимают 1 таблетку (0,002 г) на ночь; на второй день – по 1 таблетке 2 раза в сутки; на третий день – 3 таблетки. Максимальная суточная доза – 6 таблеток в сутки. После достижения терапевтического эффекта (через 10-14 дней) дозу постепенно уменьшают до 1-2 таблеток в сутки. Поддерживающая доза – 1 таблетка в сутки. Курс лечения – 3-4 недели, повторные курсы – по рекомендации врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипотензия, выраженная брадикардия, недостаточность коронарного кровообращения, органические поражения миокарда, аортальные пороки, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, нефросклероз, депрессия, дефицит сахаразы /изомальтазы, врожденная непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, набухание слизистой оболочки полости носа, повышенное потоотделение, астения, брадикардия, боль в области сердца, ухудшение течения стенокардии, развитие депрессии или утяжеление ее течения, снижение либидо. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Симптомы: выраженное снижение артериального давления вплоть до коллапса, повышенное потоотделение, общая слабость. Лечение симптоматическое: промывание желудка, прием активированного угля. При выраженном снижении артериального давления, при коллапсе больного уложить, ноги приподнять; при необходимости показано внутривенное введение реополиглюкина или раствора фенилэфрина, или других вазоконстрикторов. Специфических антидотов нет.

Взаимодействие с другими препаратами

Можно применять одновременно или последовательно с другими гипотензивными препаратами (ганглиоблокаторами, гидрохлортиазидом, гидралазином и другими). С осторожностью назначают совместно с хинидином, гуанетидином, сердечными гликозидами, бета-адреноблокаторами (опасность усиления выраженности отрицательного хроно- и дромотропного действия). Препарат способен усиливать действие этанола и барбитуратов на центральную нервную систему.

Особые указания

У пациентов с ишемической болезнью сердца возможно учащение приступов стенокардии. При появлении болей в области сердца необходимо снизить дозу Раунатина или прервать лечение (на 1-3 дня), проконсультироваться с врачом. Перед плановым оперативным вмешательством прием препарата следует прекратить за несколько дней до хирургического вмешательства. В случае необходимости экстренного хирургического вмешательства под общей анестезией у пациентов, принимающих Раунатин, необходима премедикация атропином. Не следует применять препарат перед сеансом электроимпульсной терапии. Дозу препарата следует снижать постепенно. Больным сахарным диабетом необходимо учитывать, что в одной таблетке содержится около 0,139 г углеводов (0,012 ХЕ). В период лечения препаратом пациентам следует воздерживаться от управления транспортными средствами и занятий другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В сухом месте