Инструкция по применению
Ребагит Таблетки покрытые пленочной оболочкой 100 мг 90 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Фармакор Продакшн
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Ребамипид
Количество в упаковке: 90
Дозировка действующего вещества: 100 мг
Срок годности: 2

Описание

Гастропротектор

Действующее вещество

Ребамипид

Состав

Ребамипид 100 мг. Вспомогательные вещества: маннитол - 35.7 мг, кроскармеллоза натрия - 14 мг, крахмал прежелатинизированный - 80.7 мг, натрия лаурилсульфат - 2 мг, лимонная кислота - 2.3 мг, тальк очищенный - 3.1 мг, магния стеарат - 2.2 мг. Состав пленочной оболочки: гипромеллоза - 2.77 мг, тальк очищенный - 0.57 мг, титана диоксид - 1.11 мг, пропиленгликоль - 0.55 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Всасывание и распределение После приема в дозе 100 мг Cmax достигается приблизительно через 2 ч и составляет 340 нг/мл. Повторные приемы препарата не приводят к его кумуляции в организме. В опытах in vitro показано, что от 98.4% до 98.6 % препарата связывается белками плазмы. Метаболизм и выведение T1/2 равен приблизительно 1.0 ч. Приблизительно 10 % препарата выводится почками, преимущественно в неизмененном виде. При приеме в дозе 600 мг удается выделить следы гидроксилированного метаболита.

Показания

Язвенная болезнь желудка, хронический гастрит с повышенной кислотообразующей функцией желудка в фазе обострения, эрозивный гастрит, предотвращение возникновения повреждений слизистой оболочки на фоне приема НПВП. Может использоваться в составе комбинированной терапии.

Способ применения и дозы

Внутрь, по 1 таблетке 3 раза/сут, запивая небольшим количеством жидкости. Курс лечения составляет 2-4 недели, в случае необходимости может быть продлен до 8 недель. Препарат не обладает особенностями действия при первом приеме или при его отмене. При пропуске приема одной дозы необходимо принять следующую дозу препарата в установленное время, не следует принимать удвоенную дозу препарата.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость рибамипида или других компонентов препарата, беременность, период лактации, возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Безопасность применения ребамипида в период беременности не доказана. Не применять во время беременности. Поскольку ребамипид выделяется с грудным молоком, следует прекратить грудное вскармливание или решить вопрос об искусственном вскармливании ребенка в случае необходимости назначения матери ребамипида в период кормления грудью.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: запор, метеоризм, диарея, тошнота, рвота, боль в области живота, нарушение вкусовых ощущений, изжога. Со стороны печени: признаки дисфункции печени, повышение сывороточной АЛТ и АСТ. Со стороны системы кроветворения: лейкопения, гранулоцитопения. Прочие: нарушение менструального цикла.

Передозировка

Симптомы передозировки ребамипидом не описаны, до сегодняшнего дня сведений о случаях преднамеренной передозировки не поступало. Возможны тошнота, рвота, боль в животе, диарея или запор, головная боль. Лечение: специфический антидот неизвестен. В случае передозировки следует промыть желудок и проводить симптоматическую терапию.

Взаимодействие с другими препаратами

При применении ребамипида в составе традиционных схем терапии пациентов с инфицированием Helicobacter pylori, эффективность эрадикационной терапии достоверно возрастает. Реакции взаимодействия с другими лекарственными средствами не изучены.

Особые указания

Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмами Действие препарата на скорость психомоторных реакций и/или способность управлять транспортными средствами или механизмами не изучено. В случае приема препарата следует осторожно относиться к вождению автомобиля и другим видам деятельности, требующим, повышенной концентрации внимания.

Условия хранения

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25С.