Инструкция по применению
Редецил Мазь 35 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Россия
Производитель: Акрихин
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Диоксометилтетрагидропиримидин+Ретинол
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24.0



Описание

Однородная мазь от белого до светло-желтого цвета.

Действующее вещество

Диоксометилтетрагидропиримидин+Ретинол

Состав

Действующие вещества: ретинола пальмитат (витамин А) (в пересчете на 100% ретинола пальмитат) - 0,5 г (состав на 1,0 г субстанции: витамин А пальмитат - 1,7 млн. МЕ, бутилгидроксианизол - 9 мг, бутилгидрокситолуол - 9 мг или витамин А пальмитат - 1,7 млн. МЕ, бутилгидрокситолуол - 17 мг, подсолнечное масло до 1,0 г или ретинола пальмитат - 1,7 млн. МЕ, бутилгидроксианизол - 5,5 мг, бутилгидрокситолуол - до5,5 мг), диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) - 3,0 г. Вспомогательные вещества: бутилгидрокситолуол - 0,05 г, бутилгидроксианизол - 0,05 г, воск эмульсионный - 8,0 г, парафин жидкий (масло вазелиновое) - 8,0 г, глицерол (глицерин) - 10,0 г, этанол (спирт этиловый) 95% - 10,0 г, вода очищенная до 100,0 г.

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

Редецил, легко проникает в кожу, максимальная концентрация действующих веществ в крови достигается через 3-4 часа после нанесения и сохраняется на протяжении 12 часов. Период полувыведения - 5,5 часов.

Показания

Ихтиоз, гиперкератоз, себорейный дерматит, псориаз, пиодермия, атопический дерматит, нейродермит, экзема, обморожения, ожоги, эрозии, язвы, трещины, при атрофии кожи после длительного применения глюкокортикостероидных препаратов.

Способ применения и дозы

Мазь наносят тонким слоем на пораженные участки кожи утром и вечером в течение 4-12 недель.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, гипервитаминоз А, острые воспалительные заболевания кожи.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется наносить на обширные участки кожи при беременности (I триместр), кормлении грудью.

Побочные действия

Мазь хорошо переносится. В отдельных случаях возможно усиление зуда и покраснение кожи в местах нанесения препарата, что требует временной отмены препарата до снижения остроты процесса. Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Не выявлено.

Взаимодействие с другими препаратами

Не применяют в сочетании с другими препаратами, содержащими витамин А и ретиноиды во избежание гипервитаминоза А. Несовместим с антибиотиками тетрациклинового ряда.

Условия хранения

Не допускать замерзания