Инструкция по применению
РедЭкспресс Таблетки шипучие 65 мг + 500 мг 12 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки шипучие
Страна: Россия
Производитель: Эвалар
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Кофеин+Парацетамол
Количество в упаковке: 12



Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки белого или почти белого цвета с фаской. Допускаются шероховатость и мраморность. При растворении в воде дают энергичное газирование.

Действующее вещество

Кофеин+Парацетамол

Состав

Препарат РедЭкспресс содержит Действующими веществами являются кофеин и парацетамол. Каждая шипучая таблетка содержит 65 мг кофеина и 500 мг парацетамола. Прочими (вспомогательными) веществами являются: натрия гидрокарбонат, лимонная кислота, сорбитол, натрия карбонат безводный, сахарин натрия, повидон К30, симетикон (50 % порошок), натрия лаурилсульфат. Препарат содержит сорбитол и натрий (см. раздел 2 листка-вкладыша).

Форма выпуска

Таблетки шипучие

Показания

Препарат РедЭкспресс применяется для лечения у взрослых и детей старше 12 лет в качестве:

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Взрослые Рекомендуемая доза: По 1-2 таблетки, растворенные в половине стакана воды, каждые 4-6 часов, по мере необходимости, но не более 4 раз в сутки. Максимальная суточная доза - 8 таблеток. Не превышайте указанную дозу. Передозировка парацетамола может вызвать нарушение работы печени (печеночную недостаточность). Применение у пациентов пожилого возраста Режим дозирования для пациентов пожилого возраста не отличается от режима дозирования для взрослых. Применение у пациентов с нарушением функции почек и печени Перед применением препарата РедЭкспресс пациентам с нарушением функции почек и печени необходимо предварительно проконсультироваться с врачом. Применение у детей Режим дозирования для детей старше 12 лет не отличается от режима дозирования для взрослых. Препарат РедЭкспресс противопоказан у детей в возрасте до 12 лет. Путь и способ введения Внутрь. Предварительно растворите таблетку в половине стакана воды. Полученный раствор следует принять сразу после приготовления. Продолжительность терапии Максимальная продолжительность непрерывного применения без консультации врача: 5 дней в качестве обезболивающего и 3 дня в качестве жаропонижающего средства. Следует применять наименьшую дозу, необходимую для достижения эффекта, в течение максимально короткого периода времени. Минимальный интервал между приемами препарата РедЭкспресс должен составлять не менее 4 часов.

Противопоказания

Не принимайте препарат РедЭкспресс: Препарат противопоказан детям до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом. Применение препарата в период беременности и грудного вскармливания противопоказано.Нет данных

Побочные действия

Подобно всем лекарственным препаратам препарат может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех. При длительном применении парацетамола в высоких дозах повышается вероятность гепатотоксического действия (токсическое повреждение печени), нефротоксического действия (токсическое повреждение почек) и панцитопении (снижение количества клеток крови). В случае длительного применения препарата необходим контроль картины крови. При возникновении следующих серьезных нежелательных реакций сразу прекратите прием препарата и немедленно обратитесь к врачу. Серьезные нежелательные реакции, которые очень редко наблюдались при приеме препарата РедЭкспресс (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000): Другие возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при приеме препарата РедЭкспресс Очень редкие нежелательные реакции (могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000):

Передозировка

Если Вы приняли препарата РедЭкспресс больше, чем следовало Выраженность передозировки зависит от дозы, поэтому одновременно с препаратом РедЭкспресс не следует принимать парацетамолсодержащие препараты. Симптомы (обусловлены парацетамолом) Риск передозировки выражен особенно у пожилых пациентов, у детей, у пациентов с заболеваниями печени, хроническим алкоголизмом, страдающих истощением, и у пациентов, принимающих индукторы микросомальных ферментов печени (например, рифампицин, изониазид, снотворные и противоэпилептические средства, включая фенобарбитал, фенитоин и карбамазепин). Первые признаки передозировки обычно проявляются после 24-48 ч и достигают максимального развития на 4-6 сутки. В течение первых 24 ч после передозировки могут проявиться следующие симптомы: тошнота, рвота, боли в желудки, бледность кожных покровов, анорексия (отсутствие аппетита). Через 1-2 суток определяются признаки поражения печени (болезненность в области печени, повышение активности «печеночных» ферментов), возможно развитие нарушения углеводного обмена и метаболического ацидоза (изменение pH крови в сторону повышения кислотности). В тяжелых случаях передозировки в результате печеночной недостаточности могут развиться энцефалопатия (нарушение функции мозга), кровотечения, гипогликемия (снижение уровня сахара в крови до критически низких значений), отек мозга, вплоть до летального исхода, необходимость трансплантации печени, смерть. Также возможно развитие острой почечной недостаточности с острым тубулярным некрозом, характерными признаками которого является боль в поясничной области, гематурия (кровь в моче), протеинурия (повышенное содержание белка в моче), при этом тяжелое поражение печени может отсутствовать. Отмечались случаи нарушения

сердечного ритма, панкреатита. Симптомы (обусловлены кофеином) Боль в эпигастрии, рвота, частое мочеиспускание, тахикардия, аритмия, стимуляция центральной нервной системы (бессонница, беспокойство, ажитация (двигательное беспокойство с сильным эмоциональным возбуждением), тревога, повышенная нервнорефлекторная возбудимость, тремор и судороги). Следует учитывать, что появление клинически значимых симптомов передозировки кофеина при приеме препарата всегда связано с тяжелым поражением печени на фоне передозировки парацетамола. Симптомы (обусловлены натрия гидрокарбонатом) Высокие дозы натрия гидрокарбоната могут вызвать симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, включая тошноту и рвоту. Кроме этого, высокие дозы натрия гидрокарбоната могут вызвать гипернатриемию (повышенное содержание натрия). Лечение В случае подозрения на передозировку препаратом РедЭкспресс, даже при отсутствии выраженных первых симптомов, Вам необходимо прекратить применение препарата и немедленно обратиться к врачу для оказания медицинской помощи. Возьмите с собой упаковку и/или данный листок-вкладыш, чтобы показать врачу, какой препарат Вы приняли. В течение первого часа после передозировки, но не позднее 4 ч, рекомендуется промывание желудка и прием энтеросорбентов (активированный уголь, полифепан). Следует определить концентрацию парацетамола в плазме крови, но не ранее чем через 4 ч после передозировки (более ранние результаты недостоверны). При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу. Если Вы забыли принять препарат РедЭкспресс Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты. Сообщите лечащему врачу, если Вы принимаете следующие лекарственные препараты: Препарат РедЭкспресс с алкоголем Во избежание токсического поражения печени не сочетайте парацетамол с приемом алкогольных напитков. Не принимайте препарат РедЭкспресс, если Вы склонны к хроническому потреблению алкоголя.

Особые указания

Перед приемом препарата РедЭкспресс проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Если при приеме препарата улучшение состояния не наблюдается, или головная боль становится постоянной, обратитесь к врачу. Не принимайте препарат РедЭкспресс с другими парацетамолсодержащими препаратами, поскольку совместный прием препаратов может вызвать передозировку парацетамола. В случае передозировки немедленно обратитесь к врачу. При

передозировке парацетамола возможно развитие печеночной недостаточности, которая может привести к необходимости трансплантации печени или смерти. Не принимайте препарат РедЭкспресс с кофеинсодержащими пищевыми продуктами (чай, кофе и т.д.), так как это может привести к появлению беспокойства, тревожности, раздражительности, бессонницы, головной боли, нарушениям со стороны желудочно-кишечного тракта, учащённого сердцебиения (тахикардии), сердечной аритмии. Пациенты с дефицитом глутатиона вследствие расстройства пищевого поведения, цистического фиброза (муковисцидоза), ВИЧ-инфекции, голодания, истощения подвержены передозировке, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности и перед приемом препарата рекомендуется проконсультироваться с врачом. Возможно развитие печеночной недостаточности/нарушений функции печени при небольшой передозировке парацетамола (5 г и более) у пациентов с низким уровнем глутатиона, в частности, у крайне истощенных пациентов, страдающих анорексией, хроническим алкоголизмом или пациентов с низким индексом массы тела. Применение препарата РедЭкспресс пациентами с низким уровнем глутатиона, например, при сепсисе, может повышать риск развития метаболического ацидоза, сопровождающегося симптомами учащенного, затрудненного дыхания (чувство нехватки воздуха, одышка), тошнотой, рвотой, потерей аппетита. При одновременном проявлении этих симптомов немедленно обратитесь к врачу. Сопутствующие заболевания печени повышают риск дальнейшего повреждения печени при приеме препарата РедЭкспресс. При приеме препарата у пациентов с неалкогольным циррозом печени есть высокий риск передозировки. У пациентов, страдающих атопической бронхиальной астмой, поллинозами, имеется повышенный риск развития аллергических реакций. Влияние на результаты лабораторных анализов Препарат РедЭкспресс может повлиять на результаты анализов на определение мочевой кислоты и содержание глюкозы в крови. Если Вам предстоит обследование, сообщите врачу о приеме препарата. Препарат может изменить результаты анализов допинг-контроля спортсменов. Препарат РедЭкспресс содержит натрий и сорбитол Данный препарат содержит 426,82 мг натрия на одну шипучую таблетку. Необходимо учитывать пациентам, находящимся на диете с ограничением поступления натрия. Препарат содержит сорбитол. Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата. Влияние препарата РедЭкспресс на способность управлять автомобилем и механизмами маловероятно.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Хранить в оригинальной упаковке (тубе) с целью защиты от влаги при температуре не выше 25 °С.