Инструкция по применению
Реглисам Таблетки 50 мг 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Вифитех
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Аммония глицирризинат
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 50 мг



Описание

Таблетки круглые, плоскоцилиндрической формы с фаской, от белого с желтоватым оттенком до желтого с коричневатым оттенком цвета с вкраплениями более темного цвета.

Действующее вещество

Аммония глицирризинат

Состав

Активного вещества: Глицирама (Аммония глицирризинат) в пересчете на 100% вещество - 0,025 г Вспомогательных веществ: Натрия гидроцитрата (двузамещенного) - 0,050 г Крахмала картофельного - 0,010 г Сахара молочного (лактозы моногидрат) - 1,215 г Масса гранул в упаковке - 1,3 г

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В качестве отхаркивающего средства в составе комплексной терапии при заболеваниях дыхательных путей с трудно отделяемой мокротой (в том числе при легких формах бронхиальной астмы). Экзема аллергический дерматит болезнь Аддисона (диэнцефально-гипофизарные формы как самостоятельно так и в сочетании с адренокортикотропным гормоном) астенические состояния и гипотонический синдром гипофункция коры надпочечников на фоне длительной терапии глюкокортикостероидами в том числе профилактика синдрома "отмены" в период прекращения лечения глюкокортикостероидами или снижения их дозировки (в составе комплексной терапии).

Способ применения и дозы

Внутрь за 30 минут до еды или через 30 минут после еды. Взрослым и детям старше 10 лет - по 1-2 таблетки 2 раза в день. В более тяжелых случаях разовая доза препарата составляет 2 таблетки 3-6 раз в день. Длительность лечения - от 2 недель до 6 месяцев. Возможность повторных курсов дозы препарата и длительность лечения определяются врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата тяжелые органические поражения сердца и паренхиматозных органов беременность период грудного вскармливания возраст до 10 лет.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. При длительном применении в высоких дозах возможна задержка выведения воды из организма.

Передозировка

Возможно нарушение функций печени. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Возможно усиление действия препаратов стимулирующих функцию коры надпочечников.

Особые указания

Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Применение препарата не влияет на способность к управлению транспортными средствами и занятию другими потенциально опасными видами деятельности требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Срок хранения после открытия

2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.