Инструкция по применению
Регулакс Пикосульфат Капли для приема внутрь 20 мл

Характеристики



Форма выпуска: Капли
Страна: Германия
Производитель: КРЕВЕЛЬ МОЙЗЕЛЬБАХ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Натрия пикосульфат
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 7.5 мг/1 мл
Срок годности: 60.0

Действующее вещество

Натрия пикосульфат

Состав

Действующее вещество: Натрия пикосульфатКонцентрация действующего вещества (мг): 7.5 мг

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

После приема внутрь не всасывается из ЖКТ и не подвергается печеночно-кишечной циркуляции.

Показания

- атонический запор;- регулирование стула (геморрой, проктит, трещины ануса);- подготовка к хирургическим операциям, инструментальным и рентгенологическим исследованиям.

Способ применения и дозы

Внутрь, перед сном. В зависимости от полученного эффекта дозу при последующих приемах увеличивают или уменьшают. Взрослые: начальная доза - 13 капель, при стойком запоре - до 26 капель. Для детей старше 4 лет начальная доза - 5-8 капель. Курс лечения - 7 дней.

Противопоказания

- кишечная непроходимость;- ущемленная грыжа;- острые воспалительные заболевания органов брюшной полости;- перитонит;- абдоминальные боли (неясного генеза);- кровотечения из ЖКТ;- метроррагия;- цистит;- тяжелая дегидратация;- спастический запор;- детский возраст (до 4 лет);- беременность (I триместр);- повышенная чувствительность к препарату.С осторожностью - период лактации.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано в I триместре беременности. Многократный прием препарата во время II и III триместров должен осуществляться только после тщательной оценки необходимости и рисков, поскольку нет достаточной информации о применении препарата при беременности.С осторожностью - период лактации.

Побочные действия

Возможны: диарея, абдоминальные боли, вздутие живота, обезвоживание, нарушения водно-электролитного баланса, слабость, судороги, снижение АД.

Передозировка

Симптомы: при хронической передозировке возможно развитие ишемии слизистой оболочки толстой кишки, вторичного гиперальдостеронизма, мочекаменной болезни, поражения почечных канальцев.Лечение: промывание желудка, коррекция нарушений водно-электролитного баланса, спазмолитические средства.

Взаимодействие с другими препаратами

Возможно повышение чувствительности к сердечным гликозидам. Глюкокортикостероиды, диуретики увеличивают риск развития электролитных нарушений.Антибиотики широкого спектра действия снижают послабляющий эффект.

Особые указания

Не следует принимать без врачебного контроля более 7 дней. Долгосрочный прием часто ведет к усилению закрепления кишечника.У детей следует применять только по согласованию с врачом.Подходит для больных диабетом; содержит заменители сахара; 1 мл соответствует 0.03 ХЕ.

Срок хранения после открытия

180.0

Условия хранения

В сухом месте