Инструкция по применению
Релцер Суспензия для приема внутрь 180 мл

Характеристики



Форма выпуска: Суспензия
Страна: Индия
Производитель: Glenmark Pharmaceuticals
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Алюминия гидроксид+Магния гидроксид+Симетикон+Экстракт корней солодки
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 250 мг+ 250 мг+ 40 мг+ 400 мг
Срок годности: 48

Действующее вещество

Алюминия гидроксид+Магния гидроксид+Симетикон+Экстракт корней солодки

Состав

5 мл суспензии содержат: Активные вещества: алюминия гидроксид гель6 г, магния гидроксид80 мг, симетикон100 мг, порошок корней солодки голой 400 мг, Вспомогательные вещества: гуаровая смола, сорбит, бензоат натрия, натрия цитрат, метилпарабен, пропилпарабен, сахаринат натрия, натрия гипохлорит, натрия гидроксид, масло мяты перечной, отдушка банановая, бронопол, вода очищенная.

Форма выпуска

Суспензия

Фармакокинетика

Абсорбция компонентов препарата низкая.

Показания

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения.острый гастрит.хронический гастрит с повышенной и нормальной секреторной функцией в фазе обострения.дуоденит.грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.рефлюкс-эзофагит.дискомфорт и боли в эпигастрии при погрешности в диете, после приема лекарственных средств, употребления кофе, никотина и алкоголя.

Способ применения и дозы

Взрослым и подросткам старше 15 лет препарат назначают по 5-10 мл (1/2-1 дозировочный стаканчик) 3-4 Максимальная суточная доза – 40 мл (4 дозировочных стаканчика).Для детей в возрасте от 10 до 15 лет рекомендуемая доза составляет 1/2 от рекомендованной взрослым.Продолжительность терапии составляет 14 дней. Вопрос о более длительном применении решается врачом индивидуально.Препарат принимают через 1 ч после еды и вечером перед сном или при возникновении дискомфорта, болей в эпигастрии, изжоги.Перед приемом суспензию следует гомогенизировать, встряхнув флакон.

Противопоказания

Непереносимость фруктозы.гипофосфатемия.выраженные нарушения функции почек. болезнь Альцгеймера.беременность.лактация (грудное вскармливание).детский возраст до 10 лет.повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан к применению при беременности. При необходимости применения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Побочные действия

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.Непереносимость фруктозы. Гипофосфатемия.Выраженное нарушение функции почек.Болезнь Альцгеймера. Беременность.Период грудного вскармливания.

Передозировка

Симптомы: при продолжительном применении в высоких дозах возможно образование камней в почках, запоры, сонливость, гипермагниемия; развитие признаков метаболического алкалоза (изменение настроения, боли в мышцах, нервозность, быстрая утомляемость, неприятные вкусовые ощущения). Лечение: промывание желудка, искусственная рвота, прием активированного угля.

Взаимодействие с другими препаратами

Релцер при одновременном применении может адсорбировать некоторые лекарственные средства, уменьшая таким образом их всасывание. Релцер снижает и замедляет абсорбцию дигоксина, индометацина, салицилатов, хлорпромазина, фенитоина, блокаторов гистаминовых Н2-рецепторов, бета-адреноблокаторов, дифлунизала, изониазида, антибиотиков тетрациклинового ряда, хинолонов (в т.ч. ципрофлоксацина, норфлоксацина, офлоксацина, эноксацина, грепафлоксацина), азитромицина, цефподоксима, пивампициллина, рифампицина, непрямых антикоагулянтов, барбитуратов, фексофенадина, дипиридамола, зальцитабина, желчных кислот (хенодезоксихолевой и урсодезоксихолевой), пеницилламина, препаратов железа и лития, хинидина, лансопразола, мексилетина, кетоконазола. При одновременном приеме с препаратами в кишечнорастворимых лекарственных формах изменение pH желудочного сока (более щелочная реакция) может привести к ускоренному разрушению оболочки и вызвать раздражение слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. При совместном применении м-холиноблокаторы, замедляя опорожнение желудка, усиливают и удлиняют действие препарата Релцер.

Особые указания

Интервал между приемом Релцера и других лекарственных средств должен составлять 1-2 ч. При длительном применении (более 14 дней) необходим регулярный врачебный контроль. Препарат содержит сорбитол и поэтому противопоказан при непереносимости фруктозы.