Инструкция по применению
Релцер Таблетки 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Индия
Производитель: Glenmark Pharmaceuticals
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Алюминия гидроксид+Магния гидроксид+Симетикон+Экстракт корней солодки
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 250 мг+ 250 мг+ 40 мг+ 400 мг
Срок годности: 48.0

Действующее вещество

Алюминия гидроксид+Магния гидроксид+Симетикон+Экстракт корней солодки

Состав

Алюминия гидроксид высушенный 250 мг;магния гидроксид 250 мг;симетикон 40 мг; сухой деглицирризинированный экстракт корней солодки 400 мг;Вспомогательные вещества: сахароза, натрия сахаринат, метилпарагидроксибензоат (метилпарабен), пропилпарагидроксибензоат (пропилпарабен), магния стеарат, какао-бобы, тальк, крахмал кукурузный, повидон К30, масло семян аниса, масло листьев мяты перечной.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Абсорбция компонентов препарата низкая.

Показания

Для таблеток и суспензии;— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения; — грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, рефлюкс-эзофагит; — дискомфорт и боли в эпигастрии, диспептические симптомы (изжога, отрыжка с кислым привкусом) при погрешности в диете, избыточном употреблении кофе, никотина и алкоголя.;Для таблеток;— профилактика и лечение диспептических симптомов, возникающих в результате применения НПВС и ГКС.;Для суспензии;— острый гастрит, хронический гастрит с повышенной и нормальной секреторной функцией в фазе обострения, дуоденит.

Способ применения и дозы

Взрослым и подросткам старше 15 лет препарат назначают по 1-2 таб. или по 5-10 мл (1-2 чайных ложки) 3-4 раза/сут. Максимальная суточная доза – 40 мл (8 чайных ложек).;Для детей в возрасте от 10 до 15 лет доза составляет 1/2 рекомендованной дозы для взрослых.;Продолжительность терапии составляет 14 дней. Вопрос о более длительном применении решается врачом индивидуально.;Препарат принимают ежедневно после еды и вечером перед сном или при возникновении дискомфорта, болей в эпигастрии, изжоги.;При приеме таблетки разжевывают и запивают водой.; Перед приемом суспензию следует гомогенизировать, встряхнув флакон.

Противопоказания

— непереносимость фруктозы; — гипофосфатемия; — выраженные нарушения функции почек; — болезнь Альцгеймера; — беременность; — период лактации (грудного вскармливания); — детский возраст до 10 лет; — повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан к применению при беременности.;При необходимости применения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Побочные действия

Со стороны пищеварительной системы: запор, тошнота, рвота, спазмы желудка, изменение вкусовых ощущений.;Со стороны водно-электролитного баланса: гипермагниемия, гипофосфатемия, гипокальциемия, гиперкальциурия, гипералюминиемия.;Со стороны мочевыделительной системы: нефрокальциноз, нарушение функции почек.;Со стороны костно-мышечной системы: остеомаляция, остеопороз.;Прочие: энцефалопатия, аллергические реакции. У больных с сопутствующей почечной недостаточностью – жажда, снижение АД, гипорефлексия.

Передозировка

Симптомы: при продолжительном применении в высоких дозах возможно образование камней в почках, запоры, сонливость, гипермагниемия; развитие признаков метаболического алкалоза (изменение настроения, боли в мышцах, нервозность, быстрая утомляемость, неприятные вкусовые ощущения).;Лечение: промывание желудка, искусственная рвота, прием активированного угля.

Взаимодействие с другими препаратами

Релцер при одновременном применении может адсорбировать некоторые лекарственные средства, уменьшая таким образом их всасывание. Релцер снижает и замедляет абсорбцию дигоксина, индометацина, салицилатов, хлорпромазина, фенитоина, блокаторов гистаминовых Н2-рецепторов, бета-адреноблокаторов, дифлунизала, изониазида, антибиотиков тетрациклинового ряда, хинолонов (в т.ч. ципрофлоксацина, норфлоксацина, офлоксацина, эноксацина, грепафлоксацина), азитромицина, цефподоксима, пивампициллина, рифампицина, непрямых антикоагулянтов, барбитуратов, фексофенадина, дипиридамола, зальцитабина, желчных кислот (хенодезоксихолевой и урсодезоксихолевой), пеницилламина, препаратов железа и лития, хинидина, лансопразола, мексилетина, кетоконазола.;При одновременном приеме с препаратами в кишечнорастворимых лекарственных формах изменение pH желудочного сока (более щелочная реакция) может привести к ускоренному разрушению оболочки и вызвать раздражение слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки.;При совместном применении м-холиноблокаторы, замедляя опорожнение желудка, усиливают и удлиняют действие препарата Релцер.

Особые указания

Интервал между приемом Релцера и других лекарственных средств должен составлять 1-2 ч.;При длительном применении (более 14 дней) необходим регулярный врачебный контроль.;Препарат содержит сорбитол и поэтому противопоказан при непереносимости фруктозы.

Условия хранения

В сухом месте