Инструкция по применению
Релиф Суппозитории ректальные 12 шт

Характеристики



Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Италия
Производитель: Байер
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Фенилэфрин
Количество в упаковке: 12
Дозировка действующего вещества: 5 мг
Срок годности: 24.0

Описание

Средство лечения геморроя.*Согласно данным ООО «Ай Эм Эс Хэлс», полученных из базы «Розничный аудит ГЛС и БАД в РФ», по продажам в денежном выражении, декабрь 2017 г.

Действующее вещество

Фенилэфрин

Состав

1 суппозиторий содержит Действующее вещество: фенилэфрина гидрохлорид 5 мг. Вспомогательные вещества: какао бобов масло 1770 мг, крахмал кукурузный 224,2 мг, метилпарагидроксибензоат 0,4 мг, пропилпарагидроксибензоат 0,4 мг.

Форма выпуска

Суппозитории

Показания

В качестве симптоматического средства при геморрое, трещинах заднего прохода, анальном зуде.

Способ применения и дозы

Препарат следует применять после проведения гигиенических процедур. Ректально по 1 суппозиторию утром, на ночь и после каждого опорожнения кишечника до 4 раз в сутки в течение 7-14 дней. Суппозиторий следует вводить так, чтобы он остался в анальном канале (на уровне заднепроходного отверстия), не погружаясь полностью в прямую кишку. Основание суппозитория следует придерживать марле-вой салфеткой в течение нескольких минут до полного её растворения.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, тромбоэмболическая болезнь, гранулоцитопения, детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Достаточного опыта по применению препарата во время беременности нет. Возможно применение для лечения беременных и кормящих матерей по назначению лечащего врача, если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода и ребенка.

Побочные действия

Следующие побочные реакции были зарегистрированы при использовании препаратов, содержащих фенилэфрин, в различных лекарственных формах. Поскольку эти реакции приведены в справочных материалах, либо добровольно поступают от населения в неопределенном количестве, не всегда можно достоверно оценить их частоту или установить причинно-следственную связь при применении препарата. Нарушения со стороны иммунной системы Аллергические реакции. Общие расстройства и нарушения в месте введения Раздражение по типу контактного дерматита в месте нанесения. Нарушения со стороны эндокринной системы Обострение гипертиреоза Нарушения со стороны нервной системы Тремор, бессонница, нервозность. Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы Аритмия, повышение артериального давления.

Передозировка

Продолжительное или чрезмерное местное применение фенилэфрина могут привести к нарушениям со стороны нервной системы, например, нервозности. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

Из-за содержащегося фенилэфрина снижает действие гипотензивных лекарственных средств. При одновременном назначении с антидепрессантами – ингибиторами МАО возможно развитие гипертонического криза.

Особые указания

Не рекомендуется применение у детей в возрасте до 12 лет, в период беременности и кормления грудью без согласования с врачом. В случае кровотечения, ухудшения состояния или при отсутствии эффекта в течение 7 дней необходимо прекратить применение препарата и обратится за консультацией к врачу. Не следует применять совместно с антигипертензивными лекарственными средствами и ингибиторами МАО.

Срок хранения после открытия

2 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия хранения

При комнатной температуре