Инструкция по применению
Релиф Адванс Суппозитории ректальные 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Россия
Производитель: Нижфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Бензокаин
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 206 мг



Описание

Непрозрачные суппозитории от бледно-белого до светло-желтого цвета в форме торпеды.

Действующее вещество

Бензокаин

Состав

1 суппозиторий содержит: Действующее вещество: бензокаин 206 мг.
Вспомогательные вещества: какао масло 1448 мг, крахмал кукурузный 340 мг, метилпарагидроксибензоат 2 мг, пропилпарагидроксибензоат 4 мг.

Форма выпуска

Суппозитории

Показания

Местное обезболивающее средство при геморрое трещинах заднего прохода после проктологических операций при проведении диагностических манипуляций.

Способ применения и дозы

Препарат следует применять после проведения гигиенических процедур. Взрослые и дети старше 12 лет: вводить в прямую кишку по 1 суппозиторию до 4 раз в сутки (утром на ночь и после каждого опорожнения кишечника). Дети до 12 лет: применять по указанию врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата тромбоэмболическая болезнь гранулоцитопения.

Применение при беременности и кормлении грудью

В период беременности и лактации препарат применять после консультации с врачом.

Побочные действия

Возможны местные реакции (гиперемии) аллергические реакции.

Передозировка

Симптомы передозировки могут быть связаны с фармакологическими эффектами бензокаина. Его системная абсорбция при передозировке может проявляться сонливостью беспокойством возбуждением в тяжелых случаях - судорогами. Крайне редко большие дозы бензокаина могут вызвать метгемоглобинемию которая проявляется дыхательными расстройствами и цианозом. Внутривенное введение метиленового синего является специфическим средством в лечении этого состояния. В случае значительного превышения рекомендованных разовых и суточных доз масла печени акулы может наблюдаться склонность к ускорению свертывания крови.

Особые указания

Не рекомендуется применять препарат детям до 12 лет без согласования с врачом. При случайном употреблении внутрь следует немедленно обратиться за квалифицированной помощью. При обильных кровянистых выделениях из заднего прохода или при сохранении болезненных симптомов более 7 дней необходимо проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.