Инструкция по применению
Релиф Суппозитории ректальные 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Суппозитории
Страна: Германия
Производитель: Нижфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Фенилэфрин
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 5 мг



Описание

Непрозрачные суппозитории, от почти белого до светло-желтого цвета, в форме торпеды.

Действующее вещество

Фенилэфрин

Состав

1 суппозиторий содержит Действующее вещество: фенилэфрина гидрохлорид 5 мг. Вспомогательные вещества: какао бобов масло 1770 мг, крахмал кукурузный 224,2 мг, метилпарагидроксибензоат 0,4 мг, пропилпарагидроксибензоат 0,4 мг.

Форма выпуска

Суппозитории

Показания

В качестве симптоматического средства при геморрое трещинах заднего прохода анальном зуде.

Способ применения и дозы

Препарат следует применять после проведения гигиенических процедур. Ректально по 1 суппозиторию утром на ночь и после каждого опорожнения кишечника до 4 раз в сутки в течение 7-14 дней. Суппозиторий следует вводить так чтобы он остался в анальном канале (на уровне заднепроходного отверстия) не погружаясь полностью в прямую кишку. Основание суппозитория следует придерживать марлевой салфеткой в течение нескольких минут до полного его растворения.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата тромбоэмболическая болезнь гранулоцитопения детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Достаточного опыта по применению препарата во время беременности нет. Возможно применение для лечения беременных и кормящих матерей по назначению лечащего врача если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода и ребенка.

Побочные действия

Следующие побочные реакции были зарегистрированы при использовании препаратов содержащих фенилэфрин в различных лекарственных формах. Поскольку эти реакции приведены в справочных материалах либо добровольно поступают от населения в неопределенном количестве не всегда можно достоверно оценить их частоту или установить причинно-следственную связь при применении препарата. Нарушения со стороны иммунной системы Аллергические реакции. Общие расстройства и нарушения в месте введения Раздражение по типу контактного дерматита в месте нанесения. Нарушения со стороны эндокринной системы Обострение гипертиреоза Нарушения со стороны нервной системы Тремор бессонница нервозность. Нарушения со стороны сердечнососудистой системы Аритмия повышение артериального давления.

Передозировка

Продолжительное или чрезмерное местное применение фенилэфрина могут привести к нарушениям со стороны нервной системы например нервозности. Лечение: симптоматическое.

Особые указания

Не рекомендуется применение у детей в возрасте до 12 лет в период беременности и кормления грудью без согласования с врачом. В случае кровотечения ухудшения состояния или при отсутствии эффекта в течение 7 дней необходимо прекратить применение препарата и обратиться за консультацией к врачу. Не следует применять совместно с антигипертензивными лекарственными средствами и ингибиторами МАО. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Препарат не оказывает влияния на способность управлять автомобилем и другими механизмами.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.