Инструкция по применению
Ремеброкс сироп 30 мг/5 мл 100 мл

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Индия
Производитель: С Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Амброксол
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 48.0



Действующее вещество

Амброксол

Состав

5 мл сиропа содержит:Активное вещество: амброксола гидрохлорид 30 мг.

Форма выпуска

Сироп

Фармакокинетика

После приема внутрь амброксол практически полностью абсорбируется из ЖКТ. Cmax в плазме крови достигается приблизительно через 0.5-3 ч. Не кумулирует. Связывание с белками плазмы составляет около 90%. После приема внутрь и парентерального введения амброксол быстро распределяется в тканях организма, наиболее высокая концентрация определяется в легких. Проникает через ГЭБ и плацентарный барьер, выделяется с грудным молоком. Метаболизируется в печени путем конъюгации с образованием фармакологически неактивных метаболитов. T1/2 составляет 7-12 ч. Выводится преимущественно почками в виде метаболитов - 90%, в неизмененном виде - 5%. T1/2 увеличивается при хронической почечной недостаточности тяжелой степени.

Показания

Острые и хронические заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся выделением вязкой мокроты (хронический бронхит с бронхообструктивным синдромом, бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь). Респираторный дистресс-синдром у новорожденных и недоношенных детей.

Способ применения и дозы

Внутрь взрослым и детям старше 12 лет - по 30 мг 2-3 раза/сут.В виде ингаляций взрослым и детям старше 5 лет - по 15-22.5 мг 1-2 раза/сут. Взрослым парентерально (в/м, в/в) - по 15 мг, в тяжелых случаях - по 30 мг 2-3 раза/сут. Детям в/м - 1.2-1.6 мг /кг 3 раза/сут; в/в - 1.2-1.6 мг/кг/сут. Детям в возрасте до 2 лет в/в - 15 мг/сут, кратность введения - 2 раза/сут. Детям от 2 до 5 лет в/в - 22.5 мг/сут, кратность введения - 3 раза/сут. Детям старше 5 лет - 30-45 мг/сут, кратность введения - 2-3 раза/сут. Для лечения респираторного дистресс-синдрома у недоношенных и новорожденных детей амброксол вводят в/в или в/м в дозе 10 мг/кг/сут, кратность введения - 3-4 раза/сут, при необходимости дозу можно постепенно увеличить до 30 мг/кг/сут.

Противопоказания

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, судорожный синдром различной этиологии, I триместр беременности, повышенная чувствительность к амброксолу.

Условия хранения

В сухом месте